


八代海水質調査結果

[調査日：令和5年4月11日]



調査点	水温 (°C)		塩分 (表層)	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 (μg-at/L) <表層>	無機態りん (μg-at/L) <表層>	ケイ酸態ケイ素 (μg-at/L) <表層>	珸矽酸 (μg/L) <表層>
	0m	10m		0m	10m					
①	17.0	16.6	33.6	7.8	7.8	9.0	0.6	0.03	11.2	0.3
②	17.4	17.4	33.9	7.8	7.8	10.0	0.6	0.15	7.4	0.6
③	16.9	16.7	33.6	8.1	8.2	15.0	0.1	0.07	7.8	0.1
④	16.8	16.4	33.5	8.2	8.4	15.0	0.1	0.05	8.9	0.2
⑤	16.9	17.3	33.2	8.1	8.0	13.5	0.3	0.05	11.1	0.1
⑥	17.1	16.8	33.6	7.6	7.8	14.5	1.2	0.05	8.5	0.3
⑦	17.3	16.8	33.6	7.8	7.8	15.0	0.7	0.09	8.2	0.3
⑧	17.1	16.6	33.6	8.3	8.5	15.0	0.0	0.08	7.6	0.2
⑨	17.0	16.7	32.7	8.1	8.1	14.0	0.6	0.03	14.8	0.4
⑩	16.8	16.8	33.5	7.9	8.0	16.0	0.7	0.03	7.5	0.5
⑪	17.3	16.8	33.3	8.1	7.8	15.0	0.1	0.08	9.0	0.6
⑫	16.9	16.6	31.8	8.3	8.5	12.0	1.9	0.08	25.1	1.0
平均	17.0	16.6	33.3	8.0	8.0	13.6	0.6	0.07	10.6	0.4
平年値	16.6	16.2	33.2	8.0	8.0	11.9	1.4	0.11	9.6	0.9

※ 平年値は平成元～令和4年4月の平均値

- 表層水温平均：17.0°C (平年比 +0.4°C) 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：33.3 (平年比 +0.1) 塩分は平年並みとなっています。
- 表層栄養塩類濃度：窒素, リンともに低めとなっています。
 - ・溶存無機窒素 (平均値)：0.6 μg-at/L (平年比 -0.8 μg-at/L)
 - ・溶存無機リン (平均値)：0.07 μg-at/L (平年比 -0.04 μg-at/L)