


# 八代海水質調査結果

[調査日：令和5年 11月 14日]



調査点	水温 (°C)		塩分 (表層)	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 (μg-at/L) <表層>	無機態りん (μg-at/L) <表層>	ケイ酸態ケイ素 (μg-at/L) <表層>	珸矽酸 a (μg/L) <表層>
	0m	10m		0m	10m					
①	21.9	21.9	33.4	6.9	6.8	7.0	1.7	0.31	7.6	1.4
②	21.5	21.6	33.4	6.9	6.7	7.0	2.0	0.35	8.6	1.2
③	22.0	22.0	33.5	6.8	6.8	8.0	1.8	0.31	6.5	1.1
④	21.8	21.8	33.3	6.9	6.9	8.0	1.8	0.33	7.3	0.9
⑤	21.3	21.0	33.3	7.0	7.0	6.0	2.2	0.38	10.8	1.5
⑥	22.0	22.1	33.4	6.8	7.0	8.0	1.8	0.32	6.4	0.8
⑦	21.9	22.0	33.4	6.8	6.7	8.5	2.1	0.35	5.7	1.1
⑧	22.0	22.0	33.4	6.8	6.8	7.5	1.6	0.32	7.2	0.8
⑨	21.9	21.9	33.3	6.9	6.9	7.0	1.7	0.32	6.8	1.1
⑩	22.0	22.0	33.5	6.6	6.6	8.0	2.3	0.35	5.7	0.8
⑪	21.9	22.0	33.5	6.7	6.7	9.0	2.4	0.35	5.6	1.2
⑫	22.0	22.0	33.4	6.9	6.9	7.5	1.6	0.31	6.4	1.1
平均	21.8	21.8	33.4	6.8	6.8	7.6	1.9	0.33	7.0	1.1
平年値	21.3	21.3	33.3	6.7	6.6	8.5	3.3	0.37	7.8	1.6

※ 平年値は平成元～令和4年 11月の平均値

- 表層水温平均：21.8°C (平年比 -0.5°C) 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：33.4 (平年比 +0.1) 塩分は平年並みとなっています。
- 表層栄養塩類濃度：窒素は低め、リンはやや低めとなっています。
  - ・溶存無機窒素 (平均値)：1.9 μg-at/L (平年比 -1.4 μg-at/L)
  - ・溶存無機リン (平均値)：0.33 μg-at/L (平年比 -0.04 μg-at/L)