

鹿児島県漁海況週報

平成29年8月24日発行(8月17日～8月23日)
第2718報【旧暦:6月26日～7月2日/月齢24.7～1.4/潮汐:若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月23日現在、屋久島御崎の北4.4マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月22日現在、31マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、竹島、屋久島御崎、与論で0.1～0.6℃降温し、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～1.0℃昇温した。

平年比較では、竹島で“やや低め”、甌海峡で“平年並”、中之島で“著しく高め”、その他海域で“かなり高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.2	-0.2	+1.0	かなり高め
鹿児島	29.4	+0.7	+1.3	かなり高め
佐多岬	29.0	+1.0	+1.0	かなり高め
竹島	27.8	-0.6	-0.5	やや低め
屋久島御崎	29.6	-0.1	+1.0	かなり高め
中之島	29.9	+0.1	+1.2	著しく高め
笠利崎	29.7	+0.0	+1.2	かなり高め
与路島	29.5	+0.2	+1.1	かなり高め
与論	30.0	-0.2	+1.3	かなり高め
甌海峡	27.8	+0.5	-0.4	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は8/23-24
串木野一甌定期客船観測は8/23

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ゴマサハ(250g)が1日のみ4トン、シラ(1kg)が0.4～4トン/日、ハカツオ(1kg)が1～1.5トン/日、カンパチ(0.3～1kg)が50～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1～1.2kg)が50～500kg/日、シラ(1～1.5kg)が150～300kg/日、1日のみヤマトカマス(120～150g)が500kg、ヒラソウダ(1～1.5kg)が150kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でシラ(2～4kg)が1トン、ゴマサハ(200～300g)が1トン、ハカツオ(1kg)が500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で32統がカタチイワシ、カマス、サハ類中主体に33トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でヤマトカマス、カタチイワシ、サハ類主体に14.2トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～7箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、3～5箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトヒを7～25箱/統・日、トビを9～21箱/統・日の漁。


○その他

甌島海域では、一本釣りでカンパチ(3～20kg)を20～160kg/隻・日、マダイ(1～2kg)を1日のみ20kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.4～1kg)を10～40kg/隻・日、チダイ(150～200g)を20～25kg/隻・日の漁。曳網でハカツオ(1kg)を30～40kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～300g)を5～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでイサキ(700～800g)を20kg/隻・日、ゴマサハ(1kg)を20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.3～1.5kg)を50kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣りでアオダイ(0.5～1kg)を100kg/隻・日、カンパチ(4～20kg)を40～80kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の2日操業でキンメダイ(1～1.5kg)を300kg/隻、マダイ(4kg)を200kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でマハタ(15kg)を200kg/隻、チウオ(1kg)を100kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2669報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	36	サハ類豆60 サハ類小24 マルアジ大5	35.5	0	—	2	63	
		中	33	657	甌東	マアジ仔29 サハ類豆17 ウルメイワシ15	19.9	8	87	8	107
	枕崎	大	9	428	野間池沖 甌西 馬毛島	マアジ豆61 ゴマサハ豆17 ゴマサハ中10	47.5	0	—	3	69
		中	15	556	馬毛島 甌西 野間池沖 種子島東	ゴマサハ中42 マアジ豆33 ゴマサハ豆12	37.1	0	—	8	103
	内之浦	中	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—		—	0	—	0	—	
計	大	10	463		46.3	0	0	5	132		
	中	48	1213		25.3	8	87	16	210		
東海旋網	阿久根	0	—		—	0	—	0	—		
	枕崎	0	—		—	0	—	0	—		
棒受網	阿久根	112	328	阿久根沖 長島	ウルメイワシ94	2.9	12	10	55	54	
	内之浦	2	4		ウルメイワシ100	1.9	0	—	0	—	
定置網	内之浦	32	33		カタチイワシ24 カマス23 サハ類中11	1.0	24	19	36	16	
刺網	阿久根	67	7	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.1	0	—	22	1	
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	1	736		カツオ中49 キハダ30 カツオ小11	736.4	1	1087	0	—	
	海外旋網	山川	中	1	3		3.5	0	—	0	—
		海旋	3	2130		カツオ小54 キハダ19 カツオ中16	710.0	1	90	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月23日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月23日発行「海洋通報平成29年159号」による。