

鹿児島県漁海況週報

平成29年8月31日発行(8月24日～8月30日)
第2719報【旧暦：7月3日～7月9日/月齢2.4～8.4/潮汐：中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月29日現在、屋久島御崎の北5.4マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月29日現在、40マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎で0.3℃降温し、佐多岬で変わらず、その他の海域で0.3～1.5℃昇温した。

平年比較では、佐多岬、笠利崎で“やや高め”，鹿児島、竹島、甕海峡で“かなり高め”，その他海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.6	+0.4	+1.4	著しく高め
鹿児島	29.7	+0.3	+1.6	かなり高め
佐多岬	29.0	+0.0	+0.9	やや高め
竹島	29.3	+1.5	+0.9	かなり高め
屋久島御崎	30.4	+0.8	+1.7	著しく高め
中之島	30.2	+0.3	+1.4	著しく高め
笠利崎	29.4	-0.3	+0.9	やや高め
与路島	30.7	+1.2	+2.2	著しく高め
与論	30.4	+0.4	+1.7	著しく高め
甕海峡	29.3	+1.5	+1.2	かなり高め

鹿児島～那覇定期客船観測は8/29-30
串木野～甕定期客船観測は8/30

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、シイラ(1～8kg)が4トン/日、ハガツオ(1.5～2kg)が1トン/日、カンパチ(400～500g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.3～1.5kg)が120～580kg/日、シイラ(1～3kg)が250～300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でシイラ(3～10kg)が1.5トン、ゴマサハ(200～300g)が1トン、ハガツオ(1kg)が500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で32統がウルメイワシ、カマス、サハ類小主体に31トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、カンパチ、ウルメイワシ主体に3.7トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、2～9箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～15箱/隻・日の漁。

○バショウカジキ情報

定置網では、鹿児島湾口部薩摩半島側で17～26kgサイズが週計で2尾の入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セミトビを18～20箱/統・日、中トビを13～42箱/統・日の漁。

○その他


甕島海域では、一本釣りでマダイ(1～3kg)を22～86kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～900g)を9～30kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(500～600g)を15～30kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20kg/隻・日の漁。曳網でハガツオ(1.4～1.5kg)を15～20kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(150～400g)を2～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(1～4kg)を100kg/隻・日の漁。すくい網でトビウオ(200～300g)を400尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.4～1.4kg)を25kg/隻・日の漁。刺網でヤマトカマス(100～300g)を30kg/隻・日、イセエビ(200～600g)を3kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣りでカンパチ(3kg主体)を5～30尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の2日操業でキンタイ(1kg前後)を60kg/隻、マダイ(5kg)を220kg/隻の漁。一本釣りの3日操業でキハダ(40kg)を500kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2670報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期				
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	3	86	天草沖	ウルメイワシ78	サハ類豆21	28.6	1	36	2	48	
		中	32	544	長島 串木野沖 甕東 縄瀬	コノシロ42	マアジ仔12	サハ類豆10	17.0	33	657	17	166
	枕崎	大	9	259	馬毛島 枕崎沖 黒島 野間池沖	ゴマサハ中40	マアジ豆29	ゴマサハ豆24	28.8	9	428	3	70
		中	16	486	坊津沖 枕崎沖 馬毛島 野間池沖	マアジ豆49	ゴマサハ中23	ゴマサハ豆15	30.4	15	556	11	237
	内之浦	中	0	—				—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—				—	0	—	0	—	
計	大	12	345			28.7	10	463	5	119			
	中	48	1031			21.5	48	1213	28	403			
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—			
	枕崎	1	32		ゴマサハ豆97	32.4	2	39	0	—			
棒受網	阿久根	98	142	阿久根沖 長島	ウルメイワシ91	1.5	112	328	60	104			
	内之浦	0	—			—	2	4	0	—			
定置網	内之浦	32	31		ウルメイワシ34	カマス32	サハ類小9	1.0	32	33	40	22	
刺網	阿久根	42	4	甕 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	67	7	29	3			
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—			
		小	0	—		—	0	—	0	—			
	山川	海旋	3	1328		カツオ中50	カツオ小30	キハダ14	442.6	1	736	0	—
		中	4	17		カツオ小68	キハダ25		4.2	1	3	0	—
	海旋	3	862		カツオ小54	キハダ21	カツオ中17	287.4	3	2130	2	1264	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月30日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月30日発行「海洋速報平成29年164号」による。