

鹿児島県漁海況週報

平成30年1月11日発行(1月4日～1月10日)
第2737報【旧暦:11月18日～11月24日/月齢16.9～22.9/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月10日現在、平瀬の北5.9マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月9日現在、27マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、竹島で0.9～1.5℃昇温し、その他の海域で0.3～1.2℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“著しく高め”、鹿児島で“かなり高め”、竹島、屋久島御崎で“やや高め”、黒潮流域、佐多岬、中之島で“平年並”、笠利崎、与路島、与論で“やや低め”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 22.4 | -0.6 | -0.2 | 平年並 |
| 鹿児島 | 18.4 | +1.5 | +1.0 | かなり高め |
| 佐多岬 | 18.4 | -0.3 | -0.5 | 平年並 |
| 竹島 | 21.3 | +0.9 | +0.9 | やや高め |
| 屋久島御崎 | 22.1 | -0.4 | +1.1 | やや高め |
| 中之島 | 22.6 | -0.4 | +0.3 | 平年並 |
| 笠利崎 | 21.3 | -0.8 | -0.5 | やや低め |
| 与路島 | 21.5 | -0.9 | -0.5 | やや低め |
| 与論 | 21.7 | -1.2 | -0.6 | やや低め |
| 甌海峡 | 20.5 | - | +2.8 | 著しく高め |

鹿児島～那覇定期客船観測は1/8-11
串木野～甌定期客船観測は1/8

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でハガツオ(1～2kg)が570kg、ゴマサバ(500～800g)が310kg、カンパチ(1～1.8kg)が220kg、メジナ(0.5～1.5kg)が190kgの入網。西薩南部海域では、1日のみサワラ(1～3kg)が4.5トン、ゴマサバ(200g)が500kg、マヅ(200g)が300kg、ブリ(5～8kg)が200kg、メジナ(1kg)が200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみマヅ(80g)が150kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がチウオ、サバ類中、マヅ豆主体に28トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチウツ、チウオ、ブリ主体に7.4トンの入網。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～7kgサイズを10～20尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～5kgサイズを80尾/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～4箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを1～40箱/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでマダイ(0.5～3kg)を1日のみ50kg/隻の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(1kg)を10～40kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(0.6～1kg)を25kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～1kg)を3～10kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(2～3kg)を2～3尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでマダイ(1kg)を20尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でコウイカ(100～800g)を20kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(0.2～1kg)を9kg/隻・日の漁。種子島海域では、曳縄でハガツオ(2～3kg)を30～40kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2687報)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日 | 前週 | | 前年同期 | | |
|------------|-----|----|---------|----------|--------------------|---------------------|-------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | 1統 | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 5 | 58 | 野間池沖 甌東 | 11.5 | 0 | — | 4 | 220 | |
| | | 中 | 8 | 192 | 串木野沖 野間池沖 | 24.0 | 1 | 29 | 8 | 55 | |
| | 枕崎 | 大 | 2 | 60 | 野間池沖 | 30.1 | 2 | 50 | 2 | 24 | |
| | | 中 | 6 | 139 | 野間池沖 種子島北立目崎沖 | 23.1 | 0 | — | 9 | 278 | |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 計 | 大 | 7 | 118 | | 16.8 | 2 | 50 | 6 | 244 | | |
| | 中 | 14 | 331 | | 23.7 | 1 | 29 | 17 | 333 | | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| | 枕崎 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| 棒受網 | 阿久根 | 0 | — | | — | 0 | — | 9 | 16 | | |
| | 内之浦 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| 定置網 | 内之浦 | 43 | 28 | | チウオ27 サバ類中18 マヅ豆10 | 0.7 | 21 | 13 | 50 | 30 | |
| 刺網 | 阿久根 | 13 | 1 | 甌 長島 牛深沖 | キビナゴ100 | 0.1 | 23 | 2 | 37 | 2 | |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 大 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 海旋 | 2 | 1593 | | カツオ中46 カツオ小35 キハダ14 | 796.6 | 0 | — | 0 | — |
| | | 海旋 | 2 | 810 | | カツオ小63 キハダ20 カツオ中11 | 404.8 | 0 | — | 1 | 703 |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月10日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁1月10日発行「海洋通報平成30年4号」による。