

鹿児島県漁海況週報

令和2年7月30日発行(7月23日～7月29日)
第2863報【旧暦：6月3日～6月9日/月齢：2.4～8.4/潮汐：中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月28日現在、竹島の南5.1マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月28日現在、77マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、鹿児島、中之島で0.4～0.5℃降温し、笠利崎、与路島で変わらず、その他の海域で0.2～1.7℃昇温した。

平年比較では、鹿児島で“かなり低め”、佐多岬、竹島で“やや低め”、黒潮流域、中之島で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.9	+0.2	+0.5	やや高め
鹿児島	25.9	-0.5	-1.7	かなり低め
佐多岬	26.4	+0.4	-1.2	やや低め
竹島	27.5	+1.3	-0.6	やや低め
屋久島御崎	28.5	+0.8	-0.1	平年並
中之島	29.2	-0.4	+0.3	やや高め
笠利崎	28.7	+0.0	+0.1	平年並
与路島	28.3	+0.0	-0.1	平年並
与論	28.6	+0.6	-0.2	平年並
甕海峡	27.4	+1.7	-0.3	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は7/28-29
串木野～甕定期客船観測は7/29

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、マルアジ(300～400g)が0.6～1トン/日、ヤマトカマス(100g)が500～600kg/日、イサキ(300g)が300～400kg/日、ゴマサハ(200g)が1日のみ1トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサハ(600～700g)が1.4トン、ハカツオ(1kg)が750kg、カンパチ(1kg)が250kg、イサキ(500g)が150kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がサハ類小、マアジ豆、サハ類中主体に58トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マアジ、サハ類主体に21.2トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、4～10箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ中トビを5箱/統、小トビを46箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを1～3箱/統・日、青トビを1～4箱/統・日、セトビを14～33箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、かごでシロサバフグ(150～400g)を100～150kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～1kg)を6～25kg/隻・日、チダイ(200～300g)を5～9kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を21～24kg/隻・日、イサキ400g)を8kg/隻・日、マアジ(100g)を3～5kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を1日のみ24kg/隻の漁。西薩南部海域では、一本釣りでマダイ(1～2kg)を50～100kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを週計で8トンの漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.6～1kg)を40kg/隻・日、コヘ(0.5～3kg)を10kg/隻・日の漁。かごでマダコ(0.9～2kg)を5kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでマダイ(1～3kg)を50kg/隻・日、アオダイ(0.6～1kg)を40～50kg/隻・日、タマガシラ(300～400g)を40～50kg/隻・日、カンパチ(4～5kg)を30～40kg/隻・日、ゴマサハ(600～700g)を30～40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3日操業でキハダ(30kg)を40尾/隻の漁。延縄の2日操業でキンメダイ(1.5～2kg)を200kg/隻、ムツ(1～1.5kg)を30kg/隻、メダイ(8kg)を20kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2816報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	3	60	
		中	5	15	串木野沖 甕東長島	サハ類豆24 サハ類小13 カクチイワシ11	3.1	24	138	0	—
	枕崎	大	4	100	枕崎沖 口之島 屋久島南	ウルメイワシ61 クサヤモロ小28 ゴマサハ中7	25.0	9	142	1	50
		中	9	90	枕崎沖 宇治黒島	ウルメイワシ38 ゴマサハ中26 オアカムロ中20	10.0	9	124	6	87
	内之浦	中	0	—	—	—	—	2	18	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	4	100	—	—	25.0	9	142	4	110	
	中	14	105	—	—	7.5	35	281	6	87	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	24	45	阿久根沖 長島	ウルメイワシ77 カクチイワシ15 マイワシ小7	1.9	104	142	23	72	
	内之浦	0	—	—	—	—	3	13	0	—	
定置網	内之浦	36	58	—	サハ類小52 マアジ豆13 サハ類中13	1.6	36	51	16	11	
刺網	阿久根	34	5	甕 阿久根沖 川内沖 長島	キビナゴ100	0.2	53	5	21	2	
	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—	—	—	0	—	0	—	
		海旋	0	—	—	—	—	0	—	1	695
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	1	4
		海旋	2	888	—	カツオ小94 キハダ5	443.8	2	1584	2	940



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月29日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月29日発行「海洋通報令和2年138号」による。