

# 鹿児島県漁海況週報

令和4年9月29日発行(9月22日～9月28日)  
第2972報【旧暦:8月27日～9月3日/月齢25.8～2.2/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

**○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
黒潮北縁域は、9月28日現在、屋久島御崎の南9.5マイル付近にある。


## ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月27日現在、47マイル付近にある。

## ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甌海峡で1.2℃昇温し、その他の海域で0.4～1.8℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、竹島、中之島で“平年並”、鹿児島、佐多岬、甌海峡で“かなり高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.3	—	+0.3	平年並
鹿児島	27.4	-1.8	+1.6	かなり高め
佐多岬	27.7	-1.3	+1.2	かなり高め
竹島	27.3	-1.1	+0.4	平年並
屋久島御崎(永田岬)	27.8	-0.6	+0.5	やや高め
中之島	27.8	-0.4	+0.2	平年並
笠利崎	28.2	—	+0.8	やや高め
与路島	28.3	—	+0.6	やや高め
与論	28.2	—	+0.4	やや高め
甌海峡	28.1	+1.2	+1.9	かなり高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、9/27～28(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、9/26

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、ツムブリ(2～3kg)が100～500kg/日、キンガマジ(1～1.2kg)が30～300kg/日、サワラ(300g)が200kg/日、カンパチ(0.8～1kg)が30～100kg/日、シイラ(3kg)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でサワラ(7～8kg)が940kg、カンパチ(1.3kg)が550kg、スマ(2～2.5kg)が340kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で32統がブリ、カンパチ、ヘダイ主体に30tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、カクチイシ、ヒラソウダ主体に2.7tの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～7箱/隻・日の漁。種子島海域では、1箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを90箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを55～198箱/統・日、中中トビを2～128箱/統・日、セミトビを1～3箱/統・日の漁。

### ○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(3～4kg)を25～340尾/日の漁。

### ○その他


甌島海域では、一本釣り1日のみカンパチ(10kg)を100kg/隻の漁。西薩海域では、一本釣りでスジアラ(3kg)を35～40kg/隻・日、カンパチ(0.8～1.6kg)を5～22kg/隻・日、ブリ(5kg)を10～20kg/隻・日の漁。小型底曳網でツキヒカイ(100g)を50～100kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～1kg)を5～11kg/隻・日の漁。曳縄でカマスワラ(2～5kg)を20～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒケナガエビを100～200kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、タモすくいでのヒウオ(250g)を8～12箱/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でマダイ(1～2kg)を30kg/隻・日、チウオ(1kg)を20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、ハマダイ(1～6kg)を100kg/隻・日、カンパチ(2～20kg)を60～70kg/隻・日、マダイ(4～6kg)を50kg/隻・日、タマガシラ(400～500g)を30～40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の4日操業でマダイ(3～5kg)を200kg/隻、ナンヨウキンメ(1.5～2kg)を50kg/隻、ムツ(1～1.5kg)を30kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2923報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	11	355	甌西 天草沖	サバ類豆56 ウルメイワシ35 マイワシ小5	32.3	5	90	5	100
		中	6	131	串木野沖 甌西	サバ類豆41 マアジ仔17 マアジ小8	21.8	3	20	16	78
	枕崎	大	13	614	甌下 牛深沖	ゴマサバ豆68 ウルメイワシ16 マイワシ8	47.2	1	60	0	—
		中	20	774	甌下 開聞沖	ゴマサバ豆63 ウルメイワシ28 ソウダガツオ5	38.7	9	100	2	14
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	24	969			40.4	6	150	5	100	
	中	26	904			34.8	12	120	18	92	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	2	58	甌下 西沖	ゴマサバ豆76 マアジ小15	28.9	0	—	5	534	
棒受網	阿久根	62	291	阿久根沖 長島	ウルメイワシ57 マイワシ小42	4.7	0	—	53	129	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	32	30			0.9	16	30	41	55	
刺網	阿久根	35	2	甌 川内沖	キビナゴ100	0.1	11	1	46	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	中	3	17			5.5	0	—	1	8
		海旋	0	—			—	0	—	1	716



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月28日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁9月28日発行「海洋速報令和4年180号」による。