

鹿児島県漁海況週報

平成17年7月21日(木)発行(7月14～7月20日)
第2113報(旧暦:6月9～6月15日/月齢:7.6～13.6/潮汐:小潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

前週平瀬付近にあった黒潮北縁域は、中之島付近まで離岸した後北上し、7月19日現在、屋久島御崎の南10マイル付近にある。


黒潮流軸(種子島東)

種子島東60マイル付近で前週と同じであった。

定期客船等による表面水温

表面水温は、各海域で前週より昇温し、平年比較では、佐多岬、竹島で“やや低め”、屋久島、中之島、甌海峡で“やや高め”となった。

黒潮北縁域の位置



表面水温 (7/19～20)

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.4	+0.5	+0.2	平年並み
鹿児島	27.6	+2.2	+0.5	平年並み
佐多岬	25.6	+0.1	-1.2	やや低め
竹島	26.7	+1.6	-0.8	やや低め
屋久島	28.7	+1.9	+0.7	やや高め
中之島	29.3	+1.4	+0.7	やや高め
笠利崎	28.4	+0.6	-0.1	平年並み
与路島	28.4	+0.7	+0.4	平年並み
与論	28.4	+0.9	-0.3	平年並み
甌海峡	27.6	+2.7	+0.9	やや高め
甌島西	28.7	+1.7	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/19～20
串木野 - 甌定期客船観測は7/20
甌島西(浮魚礁)観測は7/20

【漁況】

定量網

西薩南部海域では、マルソダ(500～700g)が1～2トン/日、イサキ(300～400g)が300～400kg/日の他、1日のみフリ(3kg)が800尾、ハガツオ(800g)が1.5トンの入網。

鹿児島湾口大隅半島側では、マルソダ(300～400g)が0.5～0.9トン/日の他、1日のみハガツオ(600～700g)が3トン、ハシヨウカシキ(32kg)が1尾の入網。

大隅半島東部海域では、週計で43統がウルメイワシ、マアジ主体に48.5トンの入網。

ごち網

西薩海域では、マガイ(100～300g)を30～40kg/隻・日、チダイ(150g)を20～30kg/隻・日の漁。

パッチ網

西薩海域の一部では、小羽主体に1～2トン/統・日の漁。志布志湾では、シラス主体に1トン/統・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域では、セムビ主体に50～70箱/統・日の漁。

小型底曳網

志布志湾では、ハヱ(1kg)を20～50kg/統・日、イホダイ(100g)を10～20kg/統・日、ウチワエビ(50～200g)を10kg/統・日の漁。

マグロ旗流し

奄美北部海域では、7～10日操業でキハダ(20～30kg)を1.6～2.0トン/隻と好調。


一本釣

西薩南部海域では、イサキ(250g)を20kg/隻・日、ケンサキイカ(100～150g)を10kg/隻・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、イサキ(300～400g)を50kg/隻・日の漁。熊毛海域では、ゴマサハ(600～800g)を70～80尾/隻・日、ウメイロ(800～900g)を20～30kg/隻・日、キダイ(300～400g)を20～30kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2065報)						
								前週 隻数	前週 漁獲量					
旋網	阿久根	大	3	26	阿久根 牛深	サハ類小62	マアジ小26	マアジ豆6	8.6	低調	2	17	3	37
		中	16	129	阿久根 長島 串木野 川内	サハ類小80	マアジ仔5	マアジ小5	8.1		13	46	37	226
	枕崎	大	1	21	宇治	ゴマサハ小95	ムアジ中5		21.4		5	297	4	52
		中	15	575	馬毛 宇治	ゴマサハ豆66	ゴマサハ小34		38.3	好調	12	433	10	60
	内之浦	中	0	-				-		0	-	0	-	
	山川	中	1	5		サハ類小100		4.5		0	-	1	5	
	計	大	4	47				11.8		7	314	7	89	
		中	32	708				22.1		25	479	48	291	
	東海旋網	阿久根	0	-				-		0	-	0	-	
		枕崎	0	-				-		0	-	0	-	
棒受網	阿久根	119	65	阿久根 長島	ウルメ46	キナゴ31	カクチ16	0.5	低調	95	38	149	78	
	内之浦	10	8		ウルメ95	サハ類中2	カクチ2	0.8		13	11	26	54	
定置網	内之浦	43	49		ウルメ52	マアジ仔17		1.1		51	38	41	64	
刺網	阿久根	81	14	甌	キナゴ99			0.2	低調	79	7	66	4	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-				-		0	-	0	-	
		小	1	2		シビ74			1.9		0	-	0	-
	海旋	0	-					-		1	772	0	-	
	山川	中	2	9		カツオ大11	カツオ小5	シビ2	4.7		1	1	16	89
海外旋網	瀬戸内	小	4	4		メハチ44	キハダ40	カツオ16	-		-	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター7月19日発行「東シナ海海況情報第16号」による。黒潮流軸は、海上保安庁7月20日発行「海洋速報平成17年28号」による。