



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週屋久島の南4マイル付近にあった黒潮北縁域は、南下した後北上し、9月20日現在、竹島の南8.5マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

前週種子島東55マイル付近にあった黒潮流軸は、種子島東65マイルとなり離岸した。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週比較で鹿児島・佐多岬・竹島・与路島・甌海峡で「-0.5～-0.1」°C降温、その他の海域で「+0.1～+0.8」°C昇温した。平年比較で竹島・屋久島・中之島・与路島で「平年並み」、その他は「やや高め」となった。



表面水温 (9/20～9/21)

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.6	+0.1	+0.4	やや高め
鹿児島	26.8	-0.5	+0.6	やや高め
佐多岬	27.3	-0.1	+0.5	やや高め
竹島	27.0	-0.5	-0.3	平年並み
屋久島	28.0	+0.8	+0.3	平年並み
中之島	27.9	+0.2	+0.2	平年並み
笠利崎	28.2	+0.1	+0.8	やや高め
与路島	27.9	-0.2	+0.2	平年並み
与論	28.8	+0.1	+0.9	やや高め
甌海峡	27.4	-0.2	+1.3	やや高め
甌島西	28.4	+0.8	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は9/20～9/21
串木野 - 那覇定期客船観測は9/21
甌島西(浮魚礁)観測は9/21

【漁況】

定置網

西薩南部海域ではサワラ(300g)を2.0トン/日、ヒウオ(250g)を200kg/日、鹿児島湾口薩摩半島側ではカハチ(3～4kg)を300～400尾/日、鹿児島湾口大隅半島側ではマルソウタ(300～400g)を7～8箱/日、ゴマサハ(200～300g)を600kg/日、カマスワラ(15～20kg)を20尾/日、ハマビウオ(300～400g)を70～80kg/日の入網。

ごち網

西薩海域ではマダイ(300g)を20～30kg/隻・日の漁。

キビナゴ刺網

甌海域では10箱/隻・日の漁。熊毛海域では20箱/隻・日と好漁。

トビウオロープ魚

屋久島海域では中ヒを70～140箱/統・日と好漁。

イセエビ刺網

西薩海域では150～300gサイズを1kg/隻・日、熊毛海域では300gサイズを5～6kg/隻・日と低調。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第2073報)						
						1日1統	評価	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	-		-	低調	0	-	0	-	
		中	3	9	枕崎 野間	サハ類小38 マアジ中23 マアジ小12	3.0	低調	15	126	17	61
	枕崎	大	2	57	馬毛	ゴマサハ豆99	28.5	好調	8	741	4	154
		中	5	164	開闢沖 馬毛	ゴマサハ豆81 ゴマサハ小12 マアジ中4	32.8	好調	27	1091	13	114
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
計	大	2	57			28.5		8	741	4	154	
	中	8	173			21.6		42	1217	30	176	
東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-		2	328	3	673	
棒受網	阿久根	27	19	阿久根 長島	キビナゴ68 ウルメイソ13 マアジ小6	0.7		62	36	33	16	
	内之浦	11	17		ウルメイソ84 ソウダカツオ6 サハ類中6	1.5		13	17	10	24	
定置網	内之浦	41	46		マアジ豆25 ソウダカツオ23 サハ類中16	1.1		34	34	31	9	
刺網	阿久根	51	5	甌	キビナゴ100	0.1		65	6	59	4	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		0	-	0	-	
		小	0	-			-		0	-	1	17
	海旋網	大	0	-			-		2	1541	2	1372
		小	0	-			-		1	691	1	645
海外旋網	山川	中	1	2		2.0		0	-	3	25	
	海旋網	0	-			-		1	691	1	645	
瀬戸内	小	8	11		カツオ31 キルダ13 マハチ55	-		7	13	-	-	

フグ籠

西薩海域ではサバフグ(250～300g)を150kg/隻・日の漁。

ブリ網付け漁

南薩海域では、4kgサイズを40～50尾/統・日、鹿児島湾口南側では、8～10kgサイズを1～10尾/統・日、北側では3.5kgサイズを80尾/統・日と本格的な漁を迎えた。

一本釣


熊毛海域ではゴマサハ(400g)を15～20kg/隻・日、ウメロ(600～700g)を100kg/隻・日の漁。

その他

大隅東部では底曳網によりハヒ(2kg主体)を200～300kg/統・日、熊毛海域では缶流しによりゴマサハ(300～400g)を50kg/隻・日の漁。

パショウカジ情報

定置網では、西薩南部海域で25～30kgサイズを1～2尾/統の漁。流網では、西薩南部海域で25～30kgサイズを1～2尾/隻・日、西薩南部海域で25～30kgサイズを1～2尾/隻・日、甌海域で20～30kgサイズを5～10尾/隻・日の漁で、漁場は甌島東に移動した。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター9月20日発行「東シナ海海況情報第25号」による。黒潮流軸は、海上保安庁9月21日発行「海洋速報平成17年第37号」による。