



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、竹島の南4マイルと接岸していた黒潮北縁域は、大きく南下した後北上し、4月18日現在、屋久島の北10マイルに位置している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、63マイルと前週より5マイル接岸し、平均的な位置にある。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、黒潮流域～屋久島御崎で“かなり高め”、甌海峡で“やや高め”、与路島～与論で“やや低め～かなり低め”、その他で“平年並み”となった。



表面水温

| 定点名 | 実測値 | 前週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 24.9 | +1.9 | +1.3 | かなり高め |
| 鹿児島 | 17.4 | -0.8 | -0.4 | 平年並み |
| 佐多岬 | 18.4 | -1.0 | -0.7 | 平年並み |
| 竹島 | 20.6 | -1.1 | +0.0 | 平年並み |
| 屋久島御崎 | 23.3 | +1.2 | +1.9 | かなり高め |
| 中之島 | 24.6 | +2.2 | +1.5 | かなり高め |
| 笠利崎 | 22.2 | +0.8 | -0.1 | 平年並み |
| 与路島 | 21.5 | +0.4 | -0.4 | やや低め |
| 与論 | 20.9 | -0.1 | -1.3 | かなり低め |
| 甌海峡 | 19.2 | +0.3 | +1.0 | やや高め |
| 甌島西 | 18.0 | -1.3 | - | - |

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/18～4/19
串木野 - 甌定期客船観測は4/19
甌島西(浮魚礁)観測は4/20

【漁況】

今週の特徴

前半の月夜、時化が続く中、前週に引き続き定置網へのマヅの入網が目立ち、まき網によるゴマサハが好調。

定置網

甌島海域では、マヅ(100～200g)が多いところで1～5ト/日、1日のみブリ(7～9kg)が100尾、西薩南部海域では、マヅ(100～300g)が200～800kg/日、2日間でブリ(2kg弱)が1600尾、同(7～8kg、ヤセブリ)が10尾/日、アオリイカ(1.5～2.0kg)が50～100kg/日、鹿児島湾口薩摩半島側では、マヅ(80～200g)が2～10ト/日、鹿児島湾口大隅半島側では、マヅ(100～300g)が2トの漁。

キビナゴ刺網

甌島海域では、0～11箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域では、大比120箱/統・日、中比15箱/統・日の漁。

(まき網、神受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(ト) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 評価 | 前週 | | 前年同期 | | |
|-------|------|-----|--------|------|----------------------|--------------------------|-------------|-----|-----|------|-----|------|
| | | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 0 | | | - | | 5 | 33 | 1 | 2 | |
| | | 中 | 4 | 20 | 甌東 | ウルメイワシ81 マヅ豆9 サハ類中4 | 4.9 | | 8 | 30 | 5 | 9 |
| | 枕崎 | 大 | 1 | 85 | 佐多沖 | ゴマサハ中小54 ウルメイワシ43 ゴマサハ中3 | 84.8 | 好調 | 1 | 18 | 0 | - |
| | | 中 | 9 | 370 | 佐多沖 枕崎沖 馬毛 | ゴマサハ中小46 ウルメイワシ46 ゴマサハ中5 | 41.1 | 好調 | 16 | 134 | 3 | 35 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | - | | | - | | 1 | 0 | 0 | - |
| | 山川 | 中 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - |
| | 計 | 大 | 1 | 85 | | | 85.0 | | 6 | 51 | 1 | 2 |
| | | 中 | 13 | 389 | | | 29.9 | | 25 | 165 | 8 | 44 |
| | 東海旋網 | 阿久根 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - |
| | | 枕崎 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 1 | 613 |
| 神受網 | 阿久根 | 6 | 12 | 阿久根 | カツチイワシ100 | 1.9 | 好調 | 18 | 16 | 4 | 2 | |
| | 内之浦 | 0 | - | | | - | | 0 | - | 0 | - | |
| 定置網 | 内之浦 | 55 | 37 | | マヅ小70 ソウガカツオ5 スルメイカ4 | 0.7 | 好調 | 48 | 43 | 60 | 82 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 0 | - | | | - | | 1 | 107 | 1 | 363 |
| | | 小 | 2 | 13 | | | 6.3 | | 0 | - | 0 | - |
| カツオ竿釣 | 枕崎 | 海旋 | 1 | 687 | | カツオ小64 キハダ16 カツオ中13 | 687.0 | | 1 | 412 | 0 | - |
| | | 中 | 1 | 0 | | | 0 | | 2 | 1 | 14 | 126 |
| | 山川 | 海旋 | 2 | 1010 | | カツオ小72 シビ11 カツオ中11 | 505.0 | | 0 | - | 2 | 1537 |
| | | 瀬戸内 | 小 | 4 | 8 | | カツオ90 キハダ10 | 2.0 | | 4 | 8 | |

パッチ網

西薩海域では、北部でカリ主体に4ト/統・日、他はシラス主体に1.0～1.5ト/統・日の漁。大隅東部海域ではシラス主体に1ト/統・日の漁。

ゴチ網


西薩海域では、ゴチ網で多いところでマダイ(0.2～2.0kg)を20kg/隻・日、チダイ(150～300g)を50kg/隻・日の漁。

メジロ情報(4月13日解禁)

流れ藻が少ない為、漁模様が悪く(計4～5kg/隻)19～23日の間、休漁することとなった。

一本釣・その他

西薩南部海域では、一本釣りでチウオ(500g前後)を10kg/隻・日、延縄でイトヨリ(800g前後)を10kg/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側では、潜水器漁業他でサカリを週計で13ト、大隅半島東部海域では、小型底曳網でハヱ(0.6～1.4kg)を10kg/隻・日、チダイ(100～200g)を10kg/隻・日、奄美南部海域では、1日1隻のみ旗流してキハダ(10～50kg)を500kg、4～5日操業でソデイカ(15kg前後)を10～40ハ/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月18日発行「東シナ海海況情報第3号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月19日発行「海洋速報平成18年第15号」による。