



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週南下していた黒潮北縁域は、今週急激に北上し、7月27日現在佐多岬の南11マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より接岸し40マイル付近となっている。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、与路島で“かなり高め”、鹿児島、中之島、笠利崎、与論で“やや高め”、その他の海域は“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.1	-0.2	-0.2	平年並み
鹿児島	28.4	-0.1	+1.0	やや高め
佐多岬	27.8	+1.0	+0.5	平年並み
竹島	28.1	+0.5	+0.3	平年並み
屋久島御崎	28.6	+0.0	+0.2	平年並み
中之島	29.1	-0.1	+0.4	やや高め
笠利崎	29.2	+0.8	+0.6	やや高め
与路島	29.5	+0.7	+1.2	かなり高め
与論	29.3	+1.7	+0.7	やや高め
甞海峡	27.5	-0.1	+0.1	平年並み
甞島西	27.9	+0.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/26～27  
串木野 - 甞定期客船観測は7/26  
甞島西(浮魚礁)観測は7/27

## 【漁況】

### 今週の特徴

今週も時化が多く、全般的に低調な漁模様。

### 定置網

西薩南部海域では1統のみマルソダ(400～500g)を0.3～2ト/日、ハカツオ(800～900g)を0.2～2.5ト/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、マルソダ(300～400g)が300kg/統・日、1日のみバショウカジキ(18～23kg)が3尾。志布志湾南部海域では、週計によりマアジ、ヤマトカマス主体に12.5トの漁。大隅半島東部海域では、週計により43統がマアジ、カマス主体に48.1トの漁。

### キビナゴ刺網

甞島海域では3～8箱/隻・日の漁。

### パッチ網

志布志湾では週計でシラス(製品)を0.4ト/統と低調。

### ゴチ網

西薩海域ではマイイ(0.5～3kg)を20～30kg/隻・日。チガイ(200～300g)を30kg/隻・日の漁。

### フグ籠

西薩海域ではサバフグ(200～300g)を30～100kg/隻・日の漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2115報)				
								前週隻数	前週漁獲量			
旋網	阿久根	大	0	-	-	-	-	1	5	3	131	
		中	13	107	長島 甞東 野間池 串木	カクチイワシ25 マアジ中17 マアジ仔10	8.2	14	114	32	341	
	枕崎	大	3	111	宇治 湯瀬	ゴマサバ中小58 ゴマサバ中22 Δアジ76	36.9	2	24	7	460	
		中	5	91	宇治 湯瀬 種子島東	ゴマサバ中小90 オアハム05 ゴマサバ豆2	18.2	5	113	19	774	
	内之浦	中	1	4	-	サバ類中94 Δアジ7	4	0	-	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	1	11	
	計	大	3	111	-	-	36.9	3	28	10	591	
		中	19	198	-	-	10.4	19	227	52	1126	
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	61	54	阿久根 長島	ウルメイワシ45 カクチイワシ40 キビナゴ12	0.9	62	46	104	67		
	内之浦	11	20	-	ウルメイワシ79 マアジ17 カクチイワシ1	1.8	10	7	8	10		
定置網	内之浦	43	48	-	マアジ豆26 カマス22 ハカツオ20	1.1	44	43	42	54		
刺網	阿久根	52	6	甞 阿久根	キビナゴ100	0.1	50	7	83	10		
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
		小	1	33	-	カツオ小95 マハチ5	33.3	0	-	0	-	
	海旋	1	251	-	カツオ小56 キハダ18 カツオ中13	251.0	0	-	0	-		
	山川	中	6	56	-	カツオ小96 シビ2 マハチ1	9	1	2	2	4	
		海旋	1	2	-	カツオ小83 コシガ11 シイワ6	2.0	0	-	0	-	
瀬戸内	小	-	-	-	-	-	13	23	9	5		

### 小型底曳網

大隅半島東部海域では、イホダイ(100～150g)を10～50kg/隻・日、ハヅ(0.6～3kg)を10～100kg/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳網


熊毛海域では、小ビを100箱/統・日、中ビを5～10箱/統・日の漁。

### 曳網

鹿児島湾口薩摩半島側及び甞島海域では、ハカツオ(0.8～0.9kg)を20～30尾/隻・日の漁。熊毛海域ではキハダ(2～7kg)、カツオ(2～3kg)を1対1の割合で10～30尾/隻・日の漁。

### 一本釣・その他

西薩南部海域では、一本釣でイサキ(300前後)を15～30kg/隻・日。大隅半島南部海域では、ゴマサバ(500g)を5～30kg/隻・日、マイイ(1.5～1.7kg)を50～60尾/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣によりゴマサバ(400～500g)を20～50kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター7月25日発行「東シナ海海況情報第17号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁7月26日発行「海洋速報平成18年第29号」による。