



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


8月30日に竹島南11マイル付近にあった黒潮北縁域は、その後南下し、9月5日現在では平瀬の北3マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より13マイル接岸し33マイル付近となっている。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週に比べやや降温した海域が多かったものの、引き続き全海域で“著しく高め”～“かなり高め”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.8	-0.2	+0.9	かなり高め
鹿児島	29.0	+0.3	+1.6	著しく高め
佐多岬	28.8	-0.2	+1.1	かなり高め
竹島	29.1	-0.2	+1.0	著しく高め
屋久島御崎	29.4	-0.4	+1.0	かなり高め
中之島	29.4	-0.2	+0.9	かなり高め
笠利崎	30.1	+0.0	+2.0	著しく高め
与路島	29.3	-0.8	+1.1	かなり高め
与論	30.0	+0.0	+1.6	かなり高め
甕海峡	29.2	-0.3	+1.8	かなり高め
甕島西	29.0	-0.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は9/5～6  
串木野 - 甕定期客船観測は9/6  
甕島西(浮魚礁)観測は9/6

## 【漁況】

### 今週の特徴

薩摩半島南部海域、鹿児島湾口南部側、大隅半島南部海域では、ブリ飼付け漁が開始され、甕島海域ではハシウカジキ流し網漁が本格化した。

### 定置網

鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(1.2～1.3kg)を多い日で600尾/日、カンパチ(0.6～1kg)を100尾/日、ソウダガツオ(300g)を20～30箱/日と好調。鹿児島湾口大隅半島側では、ソウダガツオ(300～400g)を800kg/日の入網。志布志湾南部海域では、週計でタチウオ、マジ、ヤマトマス主体に3.4トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で44統がマジ豆、カマス、ソウダガツオ主体に19.9トンの入網。

### パッチ網

志布志湾海域では、30日にカメ(製品)の入札が6トあった。

### トビウオロ - ブ曳

熊毛海域では種子島で小ビ主体に中ビ混じりを50箱/統・日の漁、屋久島では中ビ主体にセビ混じりを10～30箱/統・日と低調。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2121)						
								前週 漁獲量	前年同期 隻数 漁獲量					
旋網	阿久根	大	1	10	牛深沖	マジ大79	ウヰメウヰ15	サハ類小4	10.1	0	-	0	-	
		中	26	233	野瀬 川内沖 長島 串木野沖	サハ類小40	ウヰメウヰ13	カクチウヰ10	9.0	36	320	3	9	
	枕崎	大	5	239	屋久島南 島間	ゴマサハ中35	アカム021	クサヤE中中小18	47.7	好調	6	444	2	57
		中	14	285	湯瀬 島間 西新 黒島沖	ゴマサハ中小51	ゴマサハ小15	ゴマサハ豆8	20.4	24	598	5	164	
	内之浦	中	0	-					-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-					-	0	-	0	-	
	計	大	6	249					41.5	6	444	2	57	
		中	40	519					13.0	60	918	8	173	
	東海旋網	阿久根	0	-					-	0	-	0	-	
		枕崎	5	551		ゴマサハ豆78	カツオ類13	アカム05	110.2	3	301	0	-	
棒受網	阿久根	47	50	阿久根 長島 牛深	カクチウヰ23	ソウダガツオ17	サハ類小17	1.1	104	155	27	19		
	内之浦	22	23		ウヰメウヰ78	マウヰ13	ソウダガツオ9	1.1	20	24	11	17		
定置網	内之浦	44	20		マジ豆32	カマス23	ソウダガツオ14	0.5	41	23	41	46		
刺網	阿久根	52	4	甕 牛深	キナゴ100			0.1	75	10	51	5		
カツオ竿釣	枕崎	大	1	380		カツオ中91	カツオ小6	カツオ大2	380.1		0	-	0	
		小	1	25		カツオ小93	マハチ7		25.1	1	3	0	-	
	海旋	0	-					-	0	-	0	-		
	海外旋網	山川	中	10	41		カツオ小79	カツオ大11	シビ4	4	20	144	1	2
	瀬戸内	小	12	19		キハダ38	マハチ35	カツオ27	2		8	11		

### 一本釣・その他


北薩海域では、ゴチ網でマガイ(0.3～0.5kg)主体にチタイ(300～400g)混じりを10～30kg/隻・日の漁。薩摩半島南部海域では、一本釣でゴマサハ(400～600g)を500～800尾/隻・日と好調。大隅半島南部海域では、一本釣でハガツオ(1.5kg)を100kg/隻・日、イサキ(0.5～0.6kg)を10～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でハヱ(1kg)を50kg/隻・日、イホタイ(100g)を50kg/隻・日、マガイ(300～400g)を20～50kg/隻・日の漁。

### ブリ飼付け漁

薩摩半島南部海域では、4kgサイズを15尾/統・日、大隅半島南部海域では5～7kgサイズを10～15尾/統・日の漁。

### パショウカジキ情報

定置網では大隅半島南部海域で週計で18～25kgを4尾の入網。流し網では甕島海域で16～30kg主体に週計で878尾、大隅半島南部海域で18～25kgを週計で2尾の漁と本格的な漁が始まり、漁場は甕島東に形成されている。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター9月5日発行「東シナ海海況情報第23号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁9月6日発行「海洋速報平成18年第56号」による。