

鹿児島県水産技術開発センタ -〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212. FAX:0993-27-9218 HP:http://kagoshima.suigi.jp/

【海 況】

黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)


11月29日,屋久島御崎の南9マイル付近に あった黒潮北縁域は、北上し、12月5日現在 竹島の南2マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より10マイル接 岸したものの、65マイルと離岸傾向が継続し ている。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は, 鹿児島, 与路島で "平年並み",佐多岬,屋久島御崎,笠利崎 与論, 甑海峡で"やや高め", 黒潮流域, 竹 島,中之島で"かなり高め",と高め傾向の海 域が多かった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.0	-0.9	+1.0	かなり高め
鹿児島	20.2	-0.9	+0.2	平年並み
佐多岬	22.1	-0.8	+0.8	やや高め
竹島	23.8	-0.4	+1.4	かなり高め
屋久島御崎	23.9	-1.5	+1.1	やや高め
中之島	24.6	-1.3	+0.9	かなり高め
笠利崎	23.9	-0.7	+0.6	やや高め
与路島	23.8	-0.7	+0.1	平年並み
与論	24.2	-0.9	+0.5	やや高め
恒海峡	20.9	-1.2	+1.3	やや高め
飯島西	21.7	-0.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は12/5~6 串木野 - 甑定期客船観測は12/6 甑島西(浮魚礁)観測は12/6

【漁 況】

定置網

甑海域では、パショウカジキ(20~40kg)を4~8尾/日, ハカッオ(1.5~2.5kg)を1日のみ1,120kgの入網。西薩 南部海域では、マルソウタ (300~500g)を1.0~1.5トン/ 日, メアシ (100~200g)を500kg/日, ヒਁラマサ(2~3kg)を1 の漁。薩摩半島南部海域では, 6kgサイス を10~50 日のみ80尾 サワラ(600~700g)を300~1400kg/日の 尾/統・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、4 入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(1.5kg)を ~5kgサイズを30~50尾/統・日の漁。鹿児島湾口 600~800kg/日,カンパチ(1.0~2.0kg)を100~200kg/ 大隅半島側では4~5kgサイズを150~200尾/統・ 日, ゴマサバ(300~400g)を300kg/日の入網。 鹿児島 日と好調。 湾口大隅半島側では、週計によりカマスサワラ(7~16kg) を20尾, ヒラソウタ (500~600g)を300kg, バッコウカシ キ(17 ~49kg)を8尾の入網。大隅半島東部海域では, 週 計により50統がカマス、カンパチ、ソーダカッオ等を12トンの 入網。志布志湾南部海域では,週計によりマアジ,サワ ラ主体に6.6トンの入網。

パッチ網

西薩海域ではまとまった漁がな〈, 志布志湾では 週計で製品のチリメンを4トンの漁。

トピウオロ・プ曳

/ 統・日の漁。

キビナゴ流網

甑島海域では、4箱/隻・日の漁。熊毛海域で は,6箱/隻・日の漁。

プリ飼付け漁

甑海域では、5~10kgサイスを30~70尾/統・日

ゴチ網

西薩海域では, チダイ(200~300g)を60~100kg/ 隻・日, マダイ(0.4~3.0kg)を30~50kg/隻・日の漁。 一本釣・その他

甑海域では, 曳縄によりキハタ (2kg)を50~70kg/ 隻・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、曳縄 によりハガッオ(1.5~2.5kg)を20尾/隻·日の漁。熊 毛海域では、一本釣りによりコマサル (500g)を100 尾/隻・日, 旗流釣によりハショウカシキ(20~30kg) を2~3尾/隻・日の漁。奄美北部海域では,5日操 熊毛海域では中化',大化を2:1の割合で50~60箱 業の旗流釣によりキルダ(10~30kg)を300~500kg/

(まき網,棒受網,カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。) 巻種目、海港目 水場 げいり

前年同期(第2133報)

	業種	別·馮	港方	IJ水Ŧ	制け状況					月!	中间期	(第21	33報)	•
頼	漁業 種類	漁港		数	漁獲量 (トン)	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	評価	前	週 漁獲量		三同期 漁獲量	
	俚炽		大	3	, ,	熊本 甑西	サバ類中47 マアジ大32 サバ類大7	11.3		1	2	0	- 一	
		阿久根	中	4	21	阿久根沖	サバ類中67 マアジ豆12 サバ類大8	5.2		2	13	7	32	
			大	2	61	島間 屋久島南	ゴマサバ中小58 ゴマサバ中39 マアシ・中2	30.4		2	71	2	43	
	旋網	枕崎	中	4	39	宇治 開聞沖	オアカムロ22 マアシ 中小22 アカアシ 21	9.8		9	153	12	171	
		内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-	2
1		山川	中	0	-			1		0	-	0	-	
		計	大	5	95			19.0		3	74	2	43	
		ΠI	中	8	60			7.5	/	11	166	19	203	
	木/写	阿久根		0	-			-		0	-	0	-	
	旋網	枕崎		1	43		コ'マサバ豆67 モロ小26 カツオ類6	42.9		0	-	0	-	2
	棒受網	阿久根		13	6	阿久根 長島 甑 牛深	カタクチイワシ61 キビナゴ 30 ウルメイワシ8	0.4		32	26	33	23	
		内之浦		0	-			-		0	-	0	-	
	定置網	内之浦		50	12		カマス13 カンパ・チ12 ソウダ・ガ・ツオ11	0.2		50	15	54	18	
	刺網	阿久根		72	6	甑 牛深 長島	‡Ł'†j'100	0.1	,	49	5	65	6	
			大	0	-			-	Ζ,	0	-	1	414	
-	カツオ 竿釣	枕崎	小	0	-			-	/_	0	-	0	0	2
			海旋	0	-			-	_	1	599	1	767	
•	海外 旋網	山川	中海旋	0	507		カツオ小84 シビ10 カツオ中6	507.0	/	5	10	1	867	
		瀬戸内		3	3		カツオ43 , キハダ 43 , メハ チ13	1.0	/_	5	4	6	2	1
				_										_

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1:	6' 129' 130' 131' 132'
	21 黒潮流軸 黒潮北縁域 今週
32	· / 前週 <u>前週</u> 32°
	22 サル類中 チル類中 22 マアジ豆 マアジ豆
	22
	23
	17 hAQ 7 h7 y
31	7777 中小 22
31	24
	黑潮北綠域 11111
	25
	● 「」: 444. 中小
	→ 17₹∦\"中
30	307
	(') of
4	25 , " (25
28	25
\parallel	
3	ا ﴿ الْأَوْسِيرِ ا
1) £3 9 ² \
28	28
1	25
4	25
\parallel	25
-	
27	
]	表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター12月5日発行「東シ海海况情報第36号」による。 黒潮流軸は、海上保安庁12月5日発行「海洋速報平成18年第116号」による。
1	5rJ
- 11	THE