



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

3日,屋久島御崎の南6マイル付近にあった黒潮北縁域は,9日現在,屋久島御崎の南9マイル付近にある。


黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は,前週より大きく接岸し,66マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は,全海域で前週より0.3～2.0 降温した。平年と比較して,竹島,甌海峡で“やや高め”,その他の海域は“平年並み”となった。

黒潮北縁域の位置



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.8	-1.9	+0.1	平年並み
鹿児島	17.9	-0.7	+0.5	平年並み
佐多岬	19.1	-1.4	+0.1	平年並み
竹島	21.1	-1.3	+0.7	やや高め
屋久島御崎	20.3	-2.0	-0.6	平年並み
中之島	22.5	-0.4	+0.3	平年並み
笠利崎	21.6	-0.5	-0.3	平年並み
与路島	21.9	-0.3	-0.0	平年並み
与論	21.9	-0.3	-0.3	平年並み
甌海峡	18.3	-1.6	+0.9	やや高め
甌島西	18.4	-1.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は1/9～10
串木野 - 甌定期客船観測は1/10
甌島西(浮魚礁)観測は1/11

【漁況】

今週の特徴

北薩海域でカクチイワシ産卵親魚群の来遊がみられた。西薩海域でヒラメ刺網漁,南薩海域でヨコリ漁が始まった。

定置網

甌島海域では,マアジ(300g)を1日1統のみ400kg,メジナ(0.5～1.0kg)を40～70kg/日の漁。西薩南部海域では,サワ(800～900g)を5トン/日,マアジ(200g)を5トン/日,チウオ(300～400g)を5トン/日,コマサハ(400g)を1日のみ300kg,イキ(400g)を1日のみ200kg,カハチ(1.1kg)を1日のみ200kg,マアジを1日のみ200kgの入網。鹿児島湾口薩摩半島側では,カクチイワシを1日のみ1トンの入網。大隅半島東部海域では,週計で55統がマアジ小,カクチイワシ,ソウダカツオ等を18トンの入網。志布志湾南部海域では,週計でマアジ小,オコエ,チウオ,ブリ(4～5kg)等を4.1トンの入網。

キビナゴ流網

甌島海域では,5～8箱/隻/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では,4～5箱/隻/日の漁。熊毛海域では,2～10箱/隻/日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域では,大ビを50～70箱/隻/日の漁。

(まき網,棒受網,カツオ平釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2137)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	4	294	牛深沖 天草沖	サハ類豆41 マアジ仔30	73.5	好調	0	2	20	
		中	4	38	串木野沖 長島 阿久根沖	カクチイワシ47 マルアジ中25	9.5	-	0	4	45	
	枕崎	大	0	-			-	-	0	-	2	93
		中	3	48	枕崎沖 宇治島間	コマサハ小73 クサヤロ小17	15.9	-	0	5	42	
	内之浦	中	0	-			-	-	0	0	-	
	山川	中	0	-			-	-	0	0	-	
	計	大	4	294			73.5	-	0	0	4	113
		中	7	86			12.2	-	0	0	9	87
	東海旋網	阿久根	0	-			-	-	0	0	0	-
		枕崎	0	-			-	-	0	1	294	-
棒受網	阿久根	7	6	長島	カクチイワシ99 マアジ小1	0.8	-	0	5	3		
	内之浦	0	-			-	-	0	0	-		
定置網	内之浦	55	18		マアジ小21 カクチイワシ17	0.3	-	21	4	44	17	
刺網	阿久根	52	7	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.1	-	12	1	78	6	
カツオ平釣	枕崎	大	1	348		カツオ中79	348.0	-	0	1	433	
		小	0	-		カツオ大19	-	-	0	0	-	
	海旋	0	-		キルダ1	-	-	0	0	0		
	山川	中	0	-			-	-	0	0	-	
	海旋	0	-			-	-	0	0	1	743	
海外旋網	瀬戸内	小	1	0		キルダ67	0.3	低調	2	1	-	

ブリ銅付け漁

鹿児島湾口薩摩半島側では,5～6kgサイズを14～15尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では5～6kgサイズを50尾/統・日の漁。

ヒラメ刺網


西薩海域では,ヒラメ(0.8～3.0kg)を2～6尾/隻/日の漁。西薩南部海域では,ヒラメ(0.8～1.2kg)を1日のみ15尾/隻/日の漁。

一本釣・その他

西薩海域では,曳縄でサワ(700～900g)を20kg/隻/日,一本釣でマアジ(200～300g)を15～40kg/隻/日,イキ(200～600g)を50～60kg/隻/日の漁。大隅半島南部海域では,曳縄でカツオ(2kg)を50～60kg/隻/日の漁。熊毛海域では,一本釣でコマサハ(400～500g)を100～600尾/日・隻,メダイ(5～7kg)を40～100kg/隻/日の漁。

ヨコリ曳縄情報

甌海域では,ヨコリ(2～4kg)を20～50kg/隻/日,カツオ(1～4kg)を40～70kg/隻/日の漁。西薩南部海域では,ヨコリ(1.0～1.5kg)を6～13kg/隻/日,カツオ(1.5～4.0kg)を3～11kg/隻/日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では,ヨコリ(1.0～1.5kg)を5～10kg/隻/日,カツオ(1.5～5.0kg)を70～80kg/隻/日の漁。



表面水温分布図は,(社)漁業情報サービスセンター1月9日発行「東シマ海海況情報第40号」による。
黒潮流軸は,海上保安庁1月10日発行「海洋速報平成19年第4号」による。