

鹿児島県漁海況週報

平成19年2月15日(木)発行(2月8日～2月14日)
第2192報(旧暦:12月21日～12月27日/月齢:19.0～26.0/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市若本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週(2月6日)に平瀬の南9マイル付近にあった黒潮北縁域は北上し、2月13日現在、屋久島御崎の南0.8マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週と同じ52マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して竹島、与論で0.2～0.6 降温したが、その他の定点では0.1～1.1 昇温した。平年比較では黒潮流域、中之島、甌海峡が“やや高め”、竹島で“やや低め”、その他の海域では“平年並



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.2	+0.3	+0.5	やや高め
鹿児島	16.4	-0.3	+0.3	平年並み
佐多岬	18.2	+0.3	+0.4	平年並み
竹島	18.7	-0.2	-0.6	やや低め
屋久島御崎	20.4	+1.1	+0.5	平年並み
中之島	22.1	+0.5	+0.8	やや高め
笠利崎	20.9	+0.3	+0.1	平年並み
与路島	21.0	+0.1	+0.1	平年並み
与論	21.0	+0.0	-0.2	平年並み
甌海峡	16.9	+0.2	+1.1	やや高め
甌島西	18.3	+0.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/13～2/14
串木野 - 甌定期客船観測は2/13
甌島西(浮魚礁)観測は2/14

【漁況】

今週の特徴

熊毛海域では、一本釣でダイが引き続き好調。

定置網

甌島海域では、メシナ(1～1.5kg)が70～80kg/統・日、マサハ(400～500g)が40～50kg/統・日の入網。西薩南部海域では、1日1統のみカハチ(1.2～1.3kg)が150尾、ヒラキが300～400kg/統・日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では豆アジ(70～80g)が900～1200kg/統・日、マサハ(400～500g)が1日1統のみ10箱の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では1日1統のみイサキ(1～2kg)が1ト、カクチイワシ(10cm超)が6.5ト入網。大隅半島東部海域では、週計で61統がサハ類、スルメイカ、ソダガツオ主体に24トの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、スルメイカ等が2.3トの入網。熊毛海域ではマアジ(200～400g)が100～200kg/統・日の入網。

キビナゴ流網

甌島海域では、2箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では多いとき6～8箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域で、大ビを70～130箱/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域で、シラスが製品で週計4トンの漁。

刺網

西薩海域では、ヒラメ(1kg)を5～60尾/隻・日の漁。

一本釣・その他

西薩海域では、一本釣でサワラ(1kg前後)を10～20kg/隻・日、マアジ(300～400g)を20～25kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、固定式刺網でマアジ(6kg)が100尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣でマアジ(4～5kg)を7～8尾/隻・日、ゴマサハ(600～800g)を30～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でイタイ(15～20cm)を100kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でマアジ(5kg)を30～80尾/隻・日、ゴマサハ(700～900g)を200～300尾/隻・日、ハトの入網。熊毛海域ではマアジ(2kg)を20～30箱/隻・日の漁。

曳網情報

西薩南部海域では、1日のみヨコワ(1.1～1.3kg)混じりのカツオ(1.5kg)を主体に併せて100kg/隻・日の漁。


ソデカ旗流し

奄美海域では、2日～10日操業で14～15kgサイズを10尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2142報)			
								前週 隻数	前週 漁獲量		
旋網	阿久根	大	6	168	甌西	サハ類豆35 サハ類小31 ウルメイワシ30	28.0	3	31	2	20
		中	9	122	阿久根沖 錦瀬長島	カクチイワシ45 マアジ仔17 サハ類豆11	13.6	3	13	17	264
	枕崎	大	1	36	内之浦沖	ウルメイワシ84 カツオ類16	35.6	0	-	5	436
		中	19	630	内之浦沖 竹島沖 甌東沖 種子島東	ゴマサハ中小46 マアジ豆35 ゴマサハ小8	33.1	6	112	13	669
	内之浦	中	2	5		サハ類中52 マアジ小36 ソダガツオ5	2.5	3	5	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	7	204			29.1	3	31	7	456
	中	30	757				25.2	12	131	30	933
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	7	1195		クサヤモロ中小55 クサヤモロ豆21 クサヤモロ小11	170.7	0	-	3	266
棒受網	阿久根	14	25	長島 阿久根	カクチイワシ93 ソダガツオ5 キビナゴ2	1.8	3	4	25	26	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	61	24		サハ類中38 スルメイカ27 マアジ小8	0.4	55	33	49	16	
刺網	阿久根	60	5	甌 牛深 長島	キビナゴ100	0.1	55	3	102	9	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	0	-	0	
	海旋	大	0	-			-	2	1702	1	729
		小	0	-			-	0	-	0	-
海外旋網	山川	中	0	-		-	0	-	3	14	
	海旋	中	0	-		-	2	1655	1	675	
瀬戸内	小	6	4		キルガカツオ41	0.6	3	2	2	1	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター2月13日発行「東シナ海海況情報第45号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月14日発行「海洋速報平成19年第28号」による。