




【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は、前週より北上し4月18日現在、屋久島御崎の南約9.8マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は、前週より離岸し32マイル付近にある。

定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、前週と比較して屋久島御崎、笠利崎で変わらず、甌島西で1.5 昇温し、その他の海域では0.1～2.5 降温した。平年比較では笠利崎が“著しく低め”、佐多岬、与路島が“かなり低め”、竹島、屋久島御崎、与論が“やや低め”、それ以外の海域で、“平年並み”となった。



定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.2	-0.4	-0.4	平年並み
鹿児島	17.9	-1.4	+0.1	平年並み
佐多岬	16.9	-2.5	-2.2	かなり低め
竹島	19.2	-2.3	-1.4	やや低め
屋久島御崎	20.5	+0.0	-1.0	やや低め
中之島	22.6	-0.1	-0.5	平年並み
笠利崎	20.4	+0.0	-1.8	著しく低め
与路島	20.5	-0.8	-1.3	かなり低め
与論	21.7	-0.1	-0.5	やや低め
甌海峡	18.0	-1.8	-0.2	平年並み
甌島西	18.9	+1.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/18～4/19
串木野 - 甌定期客船観測は4/17～4/18
甌島西(浮魚礁)観測は4/19

【漁況】

今週の特徴
阿久根港でのまき網におけるマイワシの水揚げ量は、週計で67トとなった。

定置網
甌海域では、ブリ(9～10kg)が多いときで500尾/日、カハチ(1.5kg)が1日1統のみ169尾の入網。西薩南部海域では、ブリ(5～6kg)が50～100尾/日、ヒラマサ(4～5kg)が30～200尾/日、アカマス(130～140g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではヒラマサ(4～5kg)が20～100尾/日、チダイ(300～500g)が多いときで100kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がカクチイワシ、ソダガツオ、チダイ主体に33トの入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではマアジ(40～50g)が350～400kg/日の入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ウルメイワシ等が9.1トの入網。熊毛海域では、マアジ(300g前後)が50～140kg/日、ゴマサバ(500～700g)が80～150kg/日の入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)
養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2150報)				
								前週	前年同期	前週	前年同期	
旋網	阿久根	大	5	73	甌東 牛深沖	マイワシ中37	14.6	好調	8	198	0	0
		中	15	121	甌東 川内沖 阿久根沖 甌西	カクチイワシ46	8.0		17	234	4	20
	枕崎	大	4	334	宇治 内之浦 枕崎	ウルメイワシ41	83.5	好調	1	25	1	85
		中	12	318	馬毛 種子島東 枕崎沖 西新首根	ゴマサバ中小65	26.5		20	350	9	370
	内之浦	中	0	-			-		1	1	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
	計	大	9	407			45.2		9	223	1	85
		中	27	438			16.2		38	585	13	390
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-
		枕崎	4	820		ゴマサバ中小52	204.9		1	255	0	-
棒受網	阿久根	10	29	阿久根	マイワシ中39	2.9		6	13	6	12	
	内之浦	0	-			-		0	-	0	-	
定置網	内之浦	49	33		カクチイワシ77	0.7		60	27	55	37	
刺網	阿久根	94	14	甌	キビナコ100	0.1		68	8	59	6	
カツオ竿釣	枕崎	大	2	537		カツオ中89	268.3		0	-	0	-
		小	3	23		その他100	7.5		7	59	2	13
	海旋	1	703		カツオ小73	703.0		0	-	1	687	
	海外旋網	山川	0	-			-		0	-	1	0
瀬戸内	小	5	8		カツオ84	1.6		0	-	2	1010	
瀬戸内	小	5	8		カツオ84	1.6		0	-	4	8	

ごち網
西薩海域では、マダイ(0.5～1.0kg)を20～100kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20～30kg/隻・日の漁。


パッチ網
志布志湾海域では、シラス製品で約10トの入札があった。西薩海域では、1ト/統・日の漁。

トビウオロブ曳
熊毛海域では、大比を50～100箱(15尾入り)/統・日の漁。

キビナゴ刺網
甌島海域では、1～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、15～20箱/隻・日の漁。大隅半島南部海域側では4～5箱/隻・日の漁。

一本釣・その他
大隅半島南部海域では一本釣りによるゴマサバ(500～600g)を100～150kg/隻・日、缶流しによりゴマサバ(500～600g)を50～75kg/隻・日の漁。

ソデカ旗流し
奄美海域では、1週間操業で10～20kgサイズを600kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月17日発行「東シナ海海況情報第3号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月18日発行「海洋速報平成19年第72号」による。