



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、前週より北上し6月11日現在、竹島の北約6マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より6マイルほど接岸し、35マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して佐多岬で0.9、黒潮流域、与論で0.3、甌島西で0.2 降温し、その他の海域では0.2～1.7 昇温した。平年比較では竹島で“著しく高め”、鹿児島、佐多岬、屋久島御崎、甌海峡で“かなり高め～やや高め”、笠利崎で“かなり低め”、与路島、与論で“やや低め”、それ以外の海域で“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.6	-0.3	-0.1	平年並み
鹿児島	23.3	+1.7	+0.9	やや高め
佐多岬	24.4	-0.9	+1.8	かなり高め
竹島	26.6	+0.2	+2.9	著しく高め
屋久島御崎	26.9	+0.4	+2.3	かなり高め
中之島	26.1	+1.0	-0.0	平年並み
笠利崎	23.8	+0.6	-1.4	かなり低め
与路島	24.0	+0.3	-0.8	やや低め
与論	24.2	-0.3	-1.1	やや低め
甌海峡	23.6	+0.2	+1.0	やや高め
甌島西	22.6	-0.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/5～6/12  
串木野 - 甌定期客船観測は6/12  
甌島西(浮魚礁)観測は6/12

## 【漁況】

### 定置網

甌海域では、イサキ(500g)が約20kg/日の入網。西薩南部海域では、シイラ(5kg)が300kg～1トン/日、イサキ(500g)が200kg/日、ヒウオ(200g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、シイラ(5kg)が100kg～1トン/日、ハガツオ(1kg)が120～150kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではゴマサハ(500～600g)が500kg/日、ハガツオ(1kg)が500kg/日、イサキ(300～400g)が500kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で57統がかかちイワシ主体に44トンの入網。志布志湾南部海域では、週計がかかちイワシ主体に17.5トンの入網。

### ごち網

西薩海域では、マガイ(400g～2kg)が20～40kg/隻・日、チダイ(700g)が10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域ではマガイ(400g)が60kg/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳

熊毛海域では、種子島西で、中、小混じりで50箱/統・日、屋久島南で中、小、セミ混じりで40～50箱/統・日の漁。

### キピナゴ刺網

甌島海域では、5～35箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では約10箱/隻・日の漁。


### 一本釣・その他

西薩海域では、延縄でトヨリ(600～700g)が10～15kg/隻・日、刺網でマゴチ(0.5～2kg)が30～50kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣でゴマサハ(0.5～1kg)が30～50kg/隻・日、イサキ(500g)が10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でハガツオ(2kg)が150kg/隻・日、ゴマサハ(500g)が20～60kg/隻・日、キダイ(100～200g)が10kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2159報)			
								前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量
旋網	阿久根	大	2	12	牛深沖 甌西	チウオ43 マアジ豆28 マアジ小16	6.0	2	46	1	9
		中	28	171	甌東 長島 阿久根沖 串木野沖	かかちイワシ27 サル類豆12 マアジ小11	6.1	11	76	19	68
	枕崎	大	5	150	枕崎沖	ウルメイワシ93 ゴマサハ豆7	30.0	2	58	7	386
		中	15	305	種子島東 枕崎沖 立目沖 内之浦沖	ゴマサハ中小32 ウルメイワシ28 ゴマサハ中12	20.3	4	43	21	1259
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	計	大	7	162	-	-	23.2	4	104	8	395
		中	43	476	-	-	11.1	15	119	40	1327
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	92	99	阿久根 長島	かかちイワシ58 ウルメイワシ19 キピナゴ18	1.1	29	24	69	57	
	内之浦	15	18	-	ウルメイワシ76 かかちイワシ12 マイワシ10	1.2	1	0.4	14	4	
定置網	内之浦	57	44	-	かかちイワシ22 サル類中17 ハガツオ12	0.8	55	101	54	41	
刺網	阿久根	117	29	甌 阿久根 牛深	キピナゴ100	0.2	63	16	89	19	
カツオ竿釣 海外旋網	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-	
		小	0	-	-	-	0	-	0	-	
	海旋	2	1505	カツオ小66 カツオ中22 キルダ11	752.0	2	1542	2	1384		
	山川	中	2	16	カツオ小76 シビ17 カツオ大3	8.0	0	-	6	5	
	海旋	1	225	カツオ小90 カツオ中8 シビ3	225.0	1	765	0	-		
瀬戸内	小	6	3.8	カツオ30 キルダ40 マルチ30	0.6	-	-	-	-		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月12日発行「東シナ海海況情報第11号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月13日発行「海洋速報平成19年第109号」による。