

鹿児島県漁海況週報

平成19年6月28日(木)発行(6月21日～6月27日)
第2211報(旧暦:5月7日～5月13日/月齢:6.0～12.0/潮汐:小潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、前週より北上し6月26日現在、屋久島御崎の北約2マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より8マイルほど離岸し、38マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して佐多岬で0.7 降温し、竹島、甌海峡では同温、その他の海域では0.1～2.0 昇温した。平年比較では鹿児島、甌海峡で“かなり高め”、黒潮流域、佐多岬、屋久島御崎、中之島で“やや高め”、それ以外の海域で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.2	+0.7	+0.7	やや高め
鹿児島	25.4	+1.3	+1.5	かなり高め
佐多岬	24.7	-0.7	+0.8	やや高め
竹島	25.1	+0.0	+0.3	平年並み
屋久島御崎	26.7	+2.0	+1.3	やや高め
中之島	27.8	+0.7	+0.8	やや高め
笠利崎	26.7	+0.1	+0.2	平年並み
与路島	25.8	+1.1	+0.0	平年並み
与論	26.9	+2.0	+0.3	平年並み
甌海峡	25.0	+0.0	+1.8	かなり高め
甌島西	24.9	+1.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/21～6/27
串木野 - 甌定期客船観測は6/27
甌島西(浮魚礁)観測は6/27

【漁況】

定置網

甌海域では、ブリ(4～5kg)が約400～500本/日、ハガツオ(600～700g)が100kg/日、イサキ(700～800g)が約100kg/日、2日だけハ・ショウカジキ(30kg)が2本の入網。西薩南部海域では、シイ(5～10kg)が50～500kg/日、マルソダ(500～700g)が0.8～1.5トン/日、イサキ(500g)が400～500kg/日、ヒウオ(200g)が100～200kg/日、アカマス(150～200g)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(1.5kg)が100～400kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、マルソダ(400g)が1.7トン/日、アカマス(100g)が70～80kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で56統がカクチイワシ、マルソダ主体に165トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ウルメイワシ、チウオ主体に16トンの入網。

ごち網

西薩海域で、マダイ(0.5～4kg)が10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域で、チダイ(150～200g)が10kg/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域では、シラス製品で約2トンの入札があった。

トビウオロープ曳

熊毛海域では、種子島西で、中を主体に100箱/統・日、屋久島南でセミ主体に60～70箱/統・日の漁。

キビナゴ刺網

甌島海域では、5～40箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～10箱/隻・日の漁。


一本釣・その他

西薩海域では、曳縄でサワラ(1kg)が10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(70～80g)が15kg/隻・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣でゴマサハ(0.8～1kg)が30～40kg/隻・日、イサキ(500g)が10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣でゴマサハ(400～600g)が30～40kg/隻・日、ハガツオ(1.5～2kg)が40～50kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でゴマサハ(500～700g)が20～40kg/隻・日、キダイ(200～400g)が15kg/隻・日、建網でゴサタイ(2～3kg)が50kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2161報)			
								前週	前年同期	前週	前年同期
旋網	阿久根	大	34	甌東 野間池沖	マイワシ中73 マイワシ大19 サハ類仔3	11.4	2	27	0	-	
		中	133	長島 甌東 野間池沖	マイワシ中20 カクチイワシ17 マルソ中14	5.3	28	228	16	40	
	枕崎	大	54	屋久島南	ゴマサハ中95 カツオ類3 オカム1	26.9	5	377	9	362	
		中	405	竹島 湯瀬 種子島東 宇治	ゴマサハ中67 ゴマサハ中小26 カツオ類2	25.3	15	313	23	646	
	内之浦	0	-	-	-	-	0	-	1	5	
	山川	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	計	大	88	-	-	-	17.6	7	405	9	362
		中	538	-	-	-	13.1	43	541	40	691
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-	1	13	0	-
棒受網	阿久根	72	56	阿久根 長島	カクチイワシ68 ウルメイワシ18 サハ類仔5	0.8	77	76	54	32	
	内之浦	9	8	-	ウルメイワシ66 カクチイワシ17 マイワシ10	0.9	8	6	24	27	
定置網	内之浦	56	165	-	カクチイワシ51 マルソダ21 ハガツオ13	2.9	52	61	49	38	
刺網	阿久根	89	17	甌 阿久根	キビナゴ100	0.2	89	20	84	15	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-	
		小	16	-	カツオ小96 カツオ中5	15.6	0	-	0	-	
	海旋	0	-	-	-	-	2	1035	1	812	
	山川	8	53	-	カツオ小94 カツオ中1	7.0	1	3	0	-	
海外旋網	海旋	0	-	-	-	-	1	814	0	-	
	瀬戸内	5	3	-	メハチ42 キルガ30 カツオ28	0.6	-	-	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月26日発行「東シナ海海況情報 第13号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月27日発行「海洋通報平成19年第119号」による。