



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週より大きく南下し、4月30日現在、中之島の北3マイル付近にあり、離岸している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は4月30日現在、25マイル付近にあり、接岸している。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、鹿児島、竹島、屋久島御崎で0.4～0.8 降温し、他の海域は昇温した。平年比較では、鹿児島～竹島は“やや高め”、甌海峡が“かなり高め”、他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.4	+0.7	+0.0	平年並み
鹿児島	19.9	-0.4	+1.2	やや高め
佐多岬	21.0	+0.1	+1.3	やや高め
竹島	22.7	-0.6	+1.7	やや高め
屋久島御崎	22.6	-0.8	+0.7	平年並み
中之島	24.3	+1.6	+0.4	平年並み
笠利崎	22.5	+0.0	-0.3	平年並み
与路島	22.5	+0.1	-0.0	平年並み
与論	22.5	+0.0	-0.2	平年並み
甌海峡	21.3	+0.5	+2.3	かなり高め
甌島西	20.9	+1.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/28～5/1
串木野 - 甌定期客船観測は4/30
甌島西(浮魚礁)観測は5/1

【漁況】

定置網

甌海域では、マアジ(80～300g)が200kg/日、ブリ(6～7kg)が30～100尾/日、イタダイ(1～2kg)が30～100尾の入網。西薩南部海域では、ブリ(4～7kg)が100～200尾/日の入網。鹿児島湾薩摩半島側では、1日のみヒラマサ(4～5kg)が140尾の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、マアジ(80～300g)が2トン/日、ブリ(4～6kg)が40尾/日の入網。大隅半島南部海域では、コマサハ(500～800g)が400kg/日、ブリ(5～7kg)が20～30尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で57統がカクチイワシ、ソダガツオ、ウルメイワシ主体に48.3トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、アカマス、マアジ主体に24.0トンの入網。熊毛海域では、コマサハ(0.7～1.0kg)が200～300kgの入網。

パッチ網

西薩海域ではフリマを1～5トン/統・日の漁。志布志湾海域では入札が無かった。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2203報)			
								前週	前週	前年同期	前年同期
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	1	4	甌西	マアジ大86 マアジ中8	3.5	0	-	4	13
		中	11	23	甌東 川内沖 阿久根沖 串木野沖	マアジ小46 マアジ豆30 スルメイカ12	2.1	0	-	11	55
	枕崎	大	4	76	宇治 馬毛	カクチイワシ57 コマサハ豆40	18.9	0	-	1	9
		中	10	148	馬毛	コマサハ中84 コマサハ大7	14.8	1	17	12	123
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	5	79			15.8	0	0	5	22
		中	21	172			8.2	1	17	23	178
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	0	-			-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	19	17	阿久根沖 長島	カクチイワシ68 キビナゴ31	0.9	3	1	6	12	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	57	48		カクチイワシ33 ソダガツオ16 ウルメイワシ8	0.8	43	39	40	16	
刺網	阿久根	74	12	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.2	63	6	63	12	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-			-	0	-	0	-
		小	3	23		その他100	7.7	3	16	0	-
	海旋	中	10	74		カツオ中74 カツオ小12 キルガ7	583.0	1	677	0	-
		小	1	811		カツオ小69 キルガ20 マチ10	811.0	0	-	0	-
	瀬戸内	小					-	11	13	8	5

キビナゴ刺網


甌海域では、1～8箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～6箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを80～100箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを50～90箱/統・日、中中ヒを10～40箱/統・日、小ヒを5～15箱/統・日の漁。

その他

一本釣は西薩海域でマアジ(100g)を10～20kg/隻・日、熊毛海域でコマサハ(700～800g)を50尾/隻・日の漁。曳網は熊毛海域でキルガ(2～3kg)を30～40kg/隻・日の漁。ごち網は西薩海域でタイ(1kg)、タイ(250～300g)を合わせて20～100kgの漁。刺網は西薩海域でコイカ(1kg)を10～15kg/隻・日、西薩南部海域でタイ(5.5～6.0kg)を150～200kg/隻・日、熊毛海域でコイカ(3kg)を100kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター4月29日発行「東シナ海海況情報第5号」による。黒潮流軸は、海上保安庁4月30日発行「海洋速報平成20年第80号」による。