



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域はやや北上し、5月20日現在、屋久島御崎の南10マイル付近と中間的な位置にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は5月21日現在、48マイル付近にあり、中間的な位置にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、黒潮流域、竹島～笠利崎、与論は0.1～0.8 降温し、他の海域は昇温した。平年比較では、鹿児島、与路島は“やや高め”、竹島、屋久島御崎は“やや低め”、与論は“かなり低め”、他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.6	-0.8	+0.1	平年並み
鹿児島	21.6	+1.4	+1.3	やや高め
佐多岬	21.7	+0.4	+0.5	平年並み
竹島	21.6	-0.7	-0.9	やや低め
屋久島御崎	22.5	-0.6	-0.9	やや低め
中之島	25.4	-0.4	+0.3	平年並み
笠利崎	24.0	-0.6	+0.0	平年並み
与路島	24.3	+0.5	+0.8	やや高め
与論	22.6	-0.1	-1.4	かなり低め
甌海峡	20.8	+0.2	+0.4	平年並み
甌島西	22.5	+2.8	-	-

鹿児島～那覇定期客船観測は5/20～5/21
串木野～甌定期客船観測は5/20
甌島西(浮魚礁)観測は5/21

【漁況】

定置網

甌海域では、ブリ(5～7kg)が20～100尾/日、マアジ(100～200g)が50～400kg/日、ケンサキイカ(12cm)が50～150kg、シイラ(2～7kg)が100～500kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(4～5kg)が60尾/日、ビウオ(150～200g)が300～1000kg/日、マアジ(100g)が200～300kg/日、ウスバハギ(1kg超)が50～80kg/日の入網。鹿児島湾薩摩半島側では、一部でミスクラゲの大量入網(10～20トン/日)があり操業に支障が出ているが、1日のみカバチ(5kg)が200尾、ヒラマサ(4kg)が40尾、2日間でブリ(4～5kg)が1700尾、シイラ(7～8kg)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、コマサハ(300～500g)が200kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で59統がカクチイワシ、ウルメイワシ小主体に152.1トンの入網と好調。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マアジ、チダイ主体に38.0トンの入網。熊毛海域では、コマサハ(0.7～1.0kg)が400～600kg/日、1日のみマアジ(100～300g)が700kgの入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2207報)			
								前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量
旋網	阿久根	大	1	1	甌西	チウオ100	1.4	3	6	5	56
		中	10	39	甌東 甌西 長島	カクチイワシ56 チウオ18 マアジ小12	3.9	10	35	14	103
	枕崎	大	0	-			-	2	18	6	182
		中	8	155	硫黄島 立目崎、内之浦沖	コマサハ中48 ウルメイワシ32 コマサハ豆8	19.3	17	226	15	486
	内之浦	中	1	1		マアジ小94	1.3	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	1	1			1.4	5	24	11	238
		中	19	193			10.2	27	261	29	589
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	0	-			-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	22	17	阿久根 長島	カクチイワシ70 キビナゴ21 マアジ豆7	0.8	25	25	82	54	
	内之浦	2	0.3		キビナゴ70 カクチイワシ28	0.2	0	-	3	4	
定置網	内之浦	59	152		カクチイワシ66 ウルメイワシ9 マアジ豆5	2.6	好調	47	125	58	53
刺網	阿久根	128	26	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.2	197	54	86	24	
カツオ竿釣 海外旋網	枕崎	大	1	403		カツオ中88 カツオ小7	403.4	0	-	1	427
		小	0	-			-	0	-	0	-
	山川	海旋	5	3142		カツオ中66 カツオ小18 キルダ6	628.0	0	-	1	839
		中	2	15		カツオ小96	7.0	16	205	0	-
	瀬戸内	小	12	17		カツオ53 キルダ20 マチ20	1.5				

パッチ網

西薩海域では多いところでガリを1日のみ2トン/隻の漁。志布志湾海域では製品で8トンの入札があった。

キビナゴ刺網


甌島海域では多い船で30箱/隻・日の漁。西薩南部海域では4～5箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では4～5箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ中比を100箱/統の漁。

その他

ごち網は西薩海域でマガイ(1～2kg)を20～80kg/隻・日の漁。刺網は、西薩海域でシロキス(60～70g)を40kg/隻・日の漁。一本釣は大隅半島南部海域でコマサハ(600～700g)を40kg/隻・日、熊毛海域でコマサハ(500～700g)を20～100尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では潜水器でサカリを100～400kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター5月20日発行「東シナ海漁況情報第8号」による。黒潮流軸は、海上保安庁5月21日発行「海洋速報平成20年第93号」による。