

鹿児島県漁海況週報

平成20年8月21日発行(8月14日～8月20日)
第2268報(旧暦:7月14日～7月20日/月齢12.7～18.7/潮汐:大潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP:http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より大きく北上し、8月19日現在、屋久島御崎の北6マイル付近と接岸傾向にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は8月19日現在、64マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、鹿児島、佐多岬、中之島、与路島、甌海峡で0.1～0.5℃降温し、その他の海域は0.1～0.5℃昇温した。平年比較では、与路島、与論は“平年並み”、黒潮流域、佐多岬、竹島、中之島は“やや高め”、その他の海域は“かなり高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.5	+0.1	+0.4	やや高め
鹿児島	29.5	-0.2	+1.7	かなり高め
佐多岬	28.8	-0.5	+1.1	やや高め
竹島	28.9	+0.4	+0.7	やや高め
屋久島御崎	29.5	+0.4	+1.0	かなり高め
中之島	29.0	-0.3	+0.5	やや高め
笠利崎	29.5	+0.2	+1.3	かなり高め
与路島	28.7	-0.1	+0.5	平年並み
与論	29.0	+0.1	+0.5	平年並み
甌海峡	29.5	-0.5	+1.6	かなり高め
甌島西	28.6	+0.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/19～8/20
串木野 - 甌定期客船観測は8/19
甌島西(浮魚礁)観測は8/19

【漁況】

今週の特徴

定置網でハシロウカジキの入網が見られるようになってきた。

定置網

西薩南部海域では、キングメヅ(1～2kg)が1～3トン/日、ハガツオ(1kg)が300kg/日、シイラ(1～4kg)が多いときで300kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(900g)が500kg/日、ヤマトカマス(150g)が200kg/日、ハシロウカジキ(25～27kg)が1～3尾/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、マルソウダ(300～500g)が200～250kg/日、シイラ(2～5kg)が70～80kg/日、ハシロウカジキ(20～23kg)が週計で4尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で31統がサバ類中、マアジ、ソウダガツオ主体に79トンの入網と好調。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、ヤマトカマス、ヒラソウダ主体に3.8トンの入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期(第2219報)	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	0	-		-		4	64	1	30
		中	0	-		-		25	563	13	122
	枕崎	大	0	-		-		8	255	4	171
		中	2	32	開聞沖	マアジ小76 マアジ豆10 マアジ中8	16.0		17	316	8
	内之浦	中	0	-		-		0	-	0	-
	山川	中	0	-		-		0	-	0	-
計	大	0	0		-		12	319	5	201	
	中	2	32		16.0		42	879	21	194	
東海旋網	阿久根	0	-		-		0	-	0	-	
	枕崎	0	-		-		1	216	0	-	
棒受網	阿久根	11	13	阿久根沖 長島	ウルメワシ67 マアジ仔18 カクチワシ9	1.2		88	108	87	98
	内之浦	2	2		ウルメワシ100	1.0		13	29	9	9
定置網	内之浦	31	79		サバ類中37 マアジ豆31 ソウダガツオ13	2.5	好調	42	35	38	10
刺網	阿久根	大	0	-		-		31	4	52	6
		小	0	-		-		0	-	1	429
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		2	33	1	11
		小	0	-		-		0	-	0	-
	海旋	大	0	-		-		0	-	0	-
		小	0	-		-		0	-	0	-
海外旋網	山川	中	1	4		4.0		9	97	6	28
	海旋	0	-		カツオ小52 カツオ大29 キハダ12	-		1	712	0	-
瀬戸内	小	-	-		-		-	-	-	-	

バッチ網

志布志湾海域では製品で10トンの入札があった。

トビウオロープ曳網


熊毛海域では、1日のみ中比を30箱/統、セミビを25箱/統、小ビを50～80箱/統の漁。

キビナゴ刺網

甌島海域では2～3箱/隻・日の漁。

その他

一本釣は熊毛海域でゴマサバ(600～800g)を多いときで30～40尾/隻・日、キダイ(300g)を多いときで30kg/隻・日、カンパチ(2～3kg)が10尾/隻・日の漁。ごち網は西薩海域でマダイ(700～800g)を多いときで30kg/隻・日の漁。延縄は西薩海域でイトヨリ(400g)を10kg/隻・日、ソコイトヨリ(150g)を20kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月20日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月20日発行「海洋速報平成20年第157号」による。