

鹿児島県漁海況週報

平成21年8月27日発行(8月20日～8月26日)
第2319報(旧暦:7月1日～7月7日/月齢29.0～5.7/潮汐:大潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は8月25日現在、屋久島の御崎の南9.7マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は8月26日現在、46マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎、与論で0.5～1.0 降温し、その他の海域は0.2～0.4 升温した。平年比較では、甑海峡が“著しく高め”、中之島、与路島が“かなり高め”となった他は“やや高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.7	+0.2	+0.6	やや高め
鹿児島	28.7	+0.2	+0.9	やや高め
佐多岬	28.4	+0.3	+0.5	やや高め
竹島	29.0	+0.3	+0.7	やや高め
屋久島御崎	29.4	+0.2	+0.9	やや高め
中之島	29.6	+0.4	+1.0	かなり高め
笠利崎	28.9	-1.0	+0.7	やや高め
与路島	29.7	+0.3	+1.5	かなり高め
与論	29.4	-0.5	+0.9	やや高め
甑海峡	30.1	+0.4	+2.2	著しく高め
甑島西	30.2	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/25～26
串木野 - 甑定期客船観測は8/26
甑島西(浮魚礁)観測は8/26

【漁況】

定置網

西薩南部海域では、シラ(1kg)が2～14ト/日、マルソウダ(400～500g)が3日間で0.6～2ト/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではシラ(2～8kg)が120～130kg/日、メカ(300～400g)が120kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で26統がソウダガツオ、マアジ、カマス主体に17トの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ小、ヤマトカマス、マルソウダ主体に10.8トの入網。

キピナゴ刺網

甑海域では、3～7箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、12～29箱/隻・日の漁。熊本海域では、10箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

屋久島海域では、セビビを3～11箱/統・日、中比を1～2箱/統・日の漁。

その他

西薩海域では、刺網でイセエビ(200～300g)を7kg/隻・日、こち網でチダイ(200g)を2日間だけ30kg/隻・日、フグかごでサバフグ(300g)を100～150kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でイセエビ(300g)を5～44kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でソコイヨリ(100g)を40kg/隻・日、イセエビ(100～200g)を10～20kg/隻・日、マアジ(3kg)を20kg/隻・日、ハタ(1kg)を80kg/隻・日、刺網でイセエビ(500g)を7～8kg/隻・日、タコかごでマダコ(1kg)を5～7kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣でゴマサバ(500～600g)を20尾/隻・日、キタイ(300～500g)を3日間だけ10～40kg/隻・日、ハマダイ(2kg)を2～3日操業で200kg/隻、アオダイ(700～900g)を2～3日操業で120kg/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣でチリ(1～2kg)を3日操業で200～300kg/隻、旗流し釣でキハダ(20～30kg)を2～3日操業で1～1.5ト/隻の漁。


パショウカジキ情報

流し網では、西薩海域で20kgサイズを1日のみ7尾、西薩南部海域で28kgサイズを1日のみ5尾、鹿児島湾口部大隅半島側で25kgサイズを週計で15尾の漁。定置網では、鹿児島湾口部大隅半島側で25kgサイズが週計で2尾の入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2270報)			
								前週	前年同期		
								隻数	漁獲量		
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	0	-	2	16
		中	28	377	甑東 繩瀬川内沖 串木野沖	クルマエビ48 マアジ仔34	13.5	14	178	31	480
	枕崎	大	6	134	島間沖	マアジ中小50 マアジ中25 カイワリ15	22.3	3	40	6	533
		中	24	253	島間沖 宇治開開沖 野間池沖	ゴマサバ中23 クサヤモロ豆18 クサヤモロ小11	10.5	7	166	24	597
	内之浦	中	1	2		△0アジ78 ソウダガツオ22	2.2	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	6	134			22.3	3	40	8	548	
	中	53	632			11.9	21	344	55	1,077	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	1	220		ゴマサバ豆76 マアジ中小20	220.0	0	-	2	197	
棒受網	阿久根	98	151	阿久根沖 長島	クルマエビ94	1.5	65	131	73	117	
	内之浦	6	10		クルマエビ97	1.7	2	4	12	32	
定置網	内之浦	38	17		ソウダガツオ44 マアジ豆26 カマス16		26	18	43	82	
刺網	阿久根	79	6	甑	ヒナゴ100	0.1	39	3	46	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-		-	0	-	0	-	
		小	1	1		カツオ小97	1.0	0	-	0	-
		海旋	0	-			-	2	820	1	845
	山川	中	0	-			-	0	-	8	57
		海旋	0	-			-	1	699	0	-
瀬戸内	小					-			9	14	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月26日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月26日発行「海洋速報平成21年第160号」による。