

# 鹿児島県漁海況週報

平成22年7月22日発行(7月15日～7月21日)  
第2363報(旧暦:6月4日～6月10日/月齢3.3～9.3/潮汐:中潮～長潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は7月21日現在、屋久島御崎の南5.2マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は7月20日現在、41マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島、笠利崎で0.2～1.1 降温し、その他の海域で0.2～3.3 升温した。平年比較では鹿児島、佐多岬、竹島、屋久島御崎で“やや高め”、笠利崎で“かなり低め”となった他は“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.3	+0.4	+0.0	平年並み
鹿児島	28.0	+3.3	+0.8	やや高め
佐多岬	28.1	+2.8	+1.1	やや高め
竹島	28.6	+3.1	+1.1	やや高め
屋久島御崎	28.9	+1.5	+0.8	やや高め
中之島	28.4	-0.2	-0.3	平年並み
笠利崎	27.1	-1.1	-1.4	かなり低め
与路島	27.7	+0.7	-0.4	平年並み
与論	28.4	+0.2	-0.3	平年並み
壺海峡	27.5	+2.3	+0.5	平年並み
壺島西	26.1	+1.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/21  
串木野 - 壺定期客船観測は7/21  
壺島西(浮魚礁)観測は7/21

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(500～800g)が0.5～2トン/日、マアジ(10～150g)が100～400kg/日、ヤマトカス(50～100g)が120kg/日、アヤビウオ(100～150g)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、イサキ(0.5～1.0kg)が100kg/日、カンパチ(1.5～2.0kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マルソウダ(400～500g)が120kg/日、キハダ(38～70kg)が1日のみ3尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がカマス、マアジ、ハガツオ主体に23トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ小、ヤマトカス、マルアジ主体に16.4トンの入網。

### トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ビを5～20箱/統・日、小ビを20～70箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ビを1～10箱/統・日、青ビを4箱/統・日、セミビを20～50箱/統・日の漁。

### キビナゴ刺網

壺海域では、3～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4箱/隻・日の漁。


(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	0	-	1	2
		中	23	181	長島 壺東	カクチイワシ89 ウルメイワシ5	7.9	13	72	12	102
	枕崎	大	2	21	メクラ曾根	ウヤモロ小57 オアカム42	10.4	5	225	1	11
		中	16	219	開聞沖 佐多沖 坊津沖	カクチイワシ22 マアジ豆29 ウルメイワシ9	13.7	16	221	13	315
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	2	21			10.4	5	225	2	13	
	中	39	400			10.2	29	293	25	418	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	133	179		ウルメイワシ68 カクチイワシ23 マアジ豆5	1.3	64	55	98	168	
	内之浦	7	21		ウルメイワシ98		5	7	5	8	
定置網	内之浦	53	23		カマス37 マアジ豆29 ハガツオ9	0.4	59	35	55	47	
刺網	阿久根	大	46	4	壺	ヒナゴ100	0.1	58	6	60	9
		小	-	-			-	0	-	0	-
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	0	-
		小	0	-			-	0	-	0	-
	海旋	大	0	-			-	0	-	2	836
		小	0	-			-	0	-	0	-
海外旋網	山川	中	1	3		カツオ小100		2	5	0	-
		海旋	1	314		カツオ小67 カツオ中33	314.3	0	-	0	-
	瀬戸内	小	-	-		-	-	-	-	-	

## その他

西薩海域では、ごち網でマガイ(0.3～2kg)を10～130kg/隻・日、チダイ(200～300g)を30kg/隻・日、延縄でキダイ(200g)を30kg/隻・日、イトヨリ(300～600g)を30kg/隻・日、カゴでサバワ(250g)を150～200kg/隻・日、刺網でコショウ(1～4kg)を20kg/隻・日、アカマス(150g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマガイ(1～5kg)を30kg/隻・日、チダイ(150～250g)を40～50kg/隻・日、底曳網でツキカイ(100g)を75kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣でイサキ(0.5～1.0kg)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、イサキ(200～800g)を10kg/隻・日の漁。大隅東部海域では、底曳網でハヒ(1kg)を80kg/隻・日、ソコトヨリ(200g)を20～30kg/隻・日、マガイ(3kg)を5～30kg/隻・日、カイワリ(100g)を10～20kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣でハガツオ(3～6kg)を10～40kg/隻・日、屋久島海域では、一本釣でコマサハ(600～700g)を30～40kg/隻・日、ハマダイ(1.5kg)を40～50kg/隻・日、メダイ(5～6kg)を20～30kg/隻・日、タマガシラ(700～800g)を40～50kg/隻・日、キダイ(300～400g)を20～30kg/隻・日、刺網でコサダイ(3kg)を50～60kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月21日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁7月21日発行「海洋速報平成22年第135号」による。