

# 鹿児島県漁海況週報

平成23年8月4日発行(7月28日～8月3日)  
第2415報【旧暦：6月28日～7月4日/月齢26.8～3.3/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は8月1日現在、屋久島御崎の北6.8マイル付近と接岸している。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は8月2日現在、20マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域では0.2～0.9℃昇温した。  
平年比較では、黒潮流域、屋久島御崎、与路島、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.7	+0.5	+0.4	やや高め
鹿児島	27.3	+0.9	-0.3	平年並
佐多岬	27.6	+0.2	+0.1	平年並
竹島	28.1	+0.6	+0.2	平年並
屋久島御崎	29.1	+0.9	+0.7	やや高め
中之島	28.8	+0.9	+0.1	平年並
笠利崎	28.2	+0.3	-0.1	平年並
与路島	28.8	+0.7	+0.5	やや高め
与論	29.2	+0.6	+0.5	やや高め
甌海峡	28.2	+0.7	+0.2	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は7/31～8/3  
串木野一甌定期客船観測は8/3

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(600～700g)が2～5トン/日、ヤマトカマス(100g)が200～300kg/日、ハガツオ(1kg)が1日のみ3トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(600～800g)が1～4トン/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で40統がアマシ豆、サハ仔、カマス主体に39トンの入網。志布志湾南部海域では、週計で好ウオ、アマシ、ハモ主体に68.2トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌海域では、3～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、2～3箱/隻・日の漁。

### ○パッチ網

西薩南部海域では、1日のみシラスを0.5トン/統・日の漁。志布志湾海域はリメンが製品で4.2トンの入札。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では小トビ20～30箱/統・日、中トビ10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを12～13箱/統・日、アトビを2箱/統・日、セトビを21～33箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～3kg)を多い船で20kg/隻・日、チダイ(150～400g)を多い船で30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でチダイ(150g)を20kg/隻・日、一本釣りでハガツオ(700～800g)を多い船で20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(700～800g)を多い船で100kg/隻・日の漁。奄美海域では、一本釣りでキハダマグロ(30～60kg)を8～17尾/隻、タチウオ(1～2kg)を8～40尾/隻、ハマダイ(1kg)を多い船で30尾/隻の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均の漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2367報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	45	甌西 津倉 天草沖	サハ類豆50 ウルメイワシ21 サハ類中12	11.3	2	11	1	8
		中	28	351	長島 甌東 那本野沖 野間池沖	マイワシ小40 カタチイワシ29 ウルメイワシ14	12.5	24	168	14	145
	枕崎	大	12	521	島間沖 坊津沖 梅吉 津倉	ウルメイワシ34 コマサハ小30 コマサハ豆26	43.4	11	858	3	77
		中	36	1,081	竹島 湯瀬 種子島東 梅吉	コマサハ豆54 コマサハ中小17 コマサハ小16	30.0	26	866	8	116
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	16	566			35.4	13	870	4	85	
	中	64	1,431			22.4	50	1,033	22	261	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	146	280		ウルメイワシ59 カタチイワシ31	1.9	126	170	47	50	
	内之浦	3	4		ソウダガツオ74 ウルメイワシ22	1.2	0	—	7	21	
定置網	内之浦	40	39		アマシ豆47 サハ仔15 カマス12	1.0	43	123	29	36	
刺網	阿久根	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	大	1	739		カツオ中46 カツオ小42 キハダ7	738.6	4	2,885	0	—
		小	1	8		カツオ小71 キハダ15 コシナガ12	8.3	0	—	0	—
山川	大	0	—		—	—	0	—	0	—	
	小	0	—		—	—	0	—	0	—	
瀬戸内	小	0	—		—	—	0	—	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月3日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁8月3日発行「海洋速報平成23年144号」による。