

# 鹿児島県漁海況週報

平成23年11月2日発行(10月27日～11月1日)  
第2428報【旧暦:10月1日～10月7日/月齢0.3～6.3/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)


黒潮北縁域は11月1日現在、竹島の南7マイル付近と接岸している。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は10月31日現在、69マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島、与路島、甌海峡で0.1～0.2℃昇温し、その他の海域で0.1～0.8℃降温した。  
平年比較では、屋久島御崎、甌海峡で“やや高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.2	-0.6	+0.1	平年並
鹿児島	23.3	-0.8	+0.4	平年並
佐多岬	24.0	-0.1	+0.0	平年並
竹島	25.1	+0.2	+0.3	平年並
屋久島御崎	25.8	-0.3	+0.5	やや高め
中之島	25.8	-0.4	+0.1	平年並
笠利崎	25.0	-0.4	-0.2	平年並
与路島	26.2	+0.2	+0.3	平年並
与論	25.5	-0.4	-0.5	平年並
甌海峡	23.5	+0.1	+0.8	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は10/31～11/2  
串木野一甌定期客船観測は11/2

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、サワ(400～500g)が200～300kg・日、ヤマトカマス(120～130g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサバ(400～500g)が100kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で39統がサバ類中、マアジ小、ソウダガツオ主体に19トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、タウオ、サバ類主体に9.4トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、6～9箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で20箱/日の漁。種子島海域では、12～13箱/隻・日の漁。

### ○ブリ銅付け

甌島海域では、4～5kgサイズを270尾/統・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～6kgサイズを80尾/統・日、3～5kgサイズを100～230尾/統・日、5～7kgサイズを100尾/統・日、4～9kgサイズを80尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4～5kgサイズを150尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～6kgサイズを70～80尾/統・日の漁。

(まき網、樽受網、カツオ羊釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2379報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	20	牛深沖	サバ類小91 サバ類中8	20.0	2	10	3	21
		中	6	42	甌西 甌東	ブリ72 ウルメイワシ15 サバ類小5	7.0	13	151	6	83
	枕崎	大	6	352	坊津沖 湯瀬	ウルメイワシ55 ゴマサバ中小21 クサヤモロ豆8	58.7	4	237	8	564
		中	12	197	屋久島南 宇治内之浦沖 種子島東	クサヤモロ豆36 ゴマサバ中29 ゴマサバ中小23	16.4	14	458	38	553
	内之浦	中	0	—			—	0	—	3	7
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	7	372			53.1	6	247	11	585	
	中	18	239			13.3	27	609	47	643	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	1	104	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	85	
樽受網	阿久根	63	96	阿久根沖 長島	ウルメイワシ67 マアジ仔10 キビナゴ10	1.5	61	287	40	38	
	内之浦	0	—			—	4	21	0	—	
定置網	内之浦	39	19		サバ類中23 マアジ小16 ソウダガツオ11		43	20	46	27	
刺網	阿久根	108	17	甌	キビナゴ100	0.2	100	12	55	6	
カツオ羊釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	1	16	0	—
	海旋	1	787		カツオ中39 カツオ小36 キハダ17	787.0	1	582	0	—	
	山川	中	5	38		カツオ小49 キハダ37 シイラ11	7.6	4	37	10	110
	海旋	0	—			—	0	—	0	—	
瀬戸内	小					—					

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、2日間のみ中トビを14～19箱/統・日の漁。

### ○パッチ網


西薩海域では多い日でシラス製品で0.7トン/統の漁。西薩南部海域では、1日のみシラス製品で0.3トン/統の漁。

### ○パシヨウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で20～30kgサイズを2～4尾/日、鹿児島湾口大隅半島側では20～28kgサイズを週計で4尾の漁。流し刺網では、鹿児島湾口大隅半島側で20～28kgサイズを週計で40尾の漁。

### ○その他

西薩海域では、ゴチ網でマダイ(0.5kg～2kg)を多い船で45kg/日の漁。延縄でキダイ(200～400g)をトヨリダイ(300～500g)混じりで25kg/隻・日の漁。志布志海域では底曳網でチダイ(200～300g)を20～30kg/隻・日、ハモ(400～500g)を多い船で20～30kg/日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月1日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁11月1日発行「海洋通報平成23年第205号」による。