

# 鹿児島県漁海況週報

平成24年8月2日発行(7月26日～8月1日)  
 第2467報【旧暦：6月8日～6月14日/月齢6.9～12.9/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
 〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
 TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218  
 HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)


黒潮北縁域は、7月30日現在、屋久島御崎の北7.5マイル付近にあり、接岸している。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月31日現在、28マイル近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論で0.1℃降温し、その他の海域で0.1～1.8℃升温した。  
 平年比較では、鹿児島、竹島、屋久島御崎、中之島で“かなり高め”、黒潮流域、佐多岬、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.9	+0.2	+0.6	やや高め
鹿児島	29.1	+1.7	+1.8	かなり高め
佐多岬	28.3	+0.7	+0.8	やや高め
竹島	29.6	+1.0	+1.7	かなり高め
屋久島御崎	29.8	+0.5	+1.4	かなり高め
中之島	29.6	+0.1	+0.9	かなり高め
笠利崎	28.7	+0.4	+0.3	平年並
与路島	28.5	+0.5	+0.2	平年並
与論	28.8	-0.1	+0.1	平年並
甌海峡	29.0	+1.8	+1.4	やや高め

鹿児島—那覇定期客船観測は7/26～7/31  
 串木野—甌定期客船観測は7/31～8/1

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(800g)が3～7トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(700～800g)が多い日で6トン、ブリ(2kg)が1日のみ0.6トン、ニサダイ(1kg)が1日のみ3トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマルソウダ(300～500g)が2.5トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がウルメイワシ、マアジ、カマス主体に29トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マアジ、ヤマトカマス主体に19トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～20箱/隻・日の漁。西薩南部では、3～4箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、1～3箱/隻・日の漁。

### ○パッチ網

西薩南部海域では、シラスを1日のみ製品で0.4トン/統の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビウオ主体に30箱/統・日の漁。屋久島海域では、セミトビウオ主体に1～250箱/統・日の漁。

### ○その他


甌島海域では、一本釣りメダイ(2～3kg)を70～80kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でメダイ(0.5～2kg)を20～30kg/隻・日、チダイ(100～300g)を16～100kg/隻・日の漁。カゴでサバフグ(200g)を100～150kg/隻・日の漁。延縄でイサキ(500～700g)を10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でメダイ(0.2～1kg)を15kg/隻・日の漁。一本釣りメダイ(200～400g)を多い船で10～15kg/日の漁。大隅半島南部海域では、イサキ(400～600g)を10kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(700g)を多い船で60～70kg/隻・日、メダイ(1～2kg)を多い船で10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でカツオ(2.5～3kg)を5～15尾/隻・日、アオダイ(600～900g)を20～30kg/隻・日、ハマダイ(1～3kg)を3日操業で200kg/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りメダイ(30～70kg)を3～5日操業で6～24尾/隻、チウオ(0.8～2kg)を3日操業で20～120尾/隻の漁。延縄の3日操業でキンメダイ(0.7～1kg)を150尾/隻、ムツ(1～14kg)を53尾/隻、メダイ(4～8kg)を500kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2418報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日					
						1統	前週	前年同期	漁獲量		
旋網	阿久根	大	4	90	牛深沖 縄瀬 天草沖 甌東	ウルメイワシ44 サバ類16 マイワシ小12	22.4	2	46	0	—
		中	34	420	長島 縄瀬 甌東 牛深沖	コシロ47 ウルメイワシ25 カサチウソ8	12.4	37	223	16	101
	枕崎	大	2	102	野間池沖	ウルメイワシ81 マイワシ19	51.0	7	221	8	566
		中	10	193	竹島 立目崎沖 野間池沖 甌東	ウルメイワシ33 ゴマサハ中小27 ゴマサハ中26	19.3	15	203	17	674
	内之浦	中	0	—			—	1	1	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	6	192			31.9	9	267	8	566
	中	44	614				13.9	53	427	33	775
	東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—
		枕崎	0	—			—	0	—	0	—
棒受網	阿久根	117	191	阿久根沖 長島	ウルメイワシ61 カサチウソ33	1.6	110	240	93	178	
	内之浦	2	1		ウルメイワシ55 ソウダカツオ41	0.6	0	—	5	20	
定置網	内之浦	36	29		ウルメイワシ32 マアジ23 カマス15	0.8	44	50	44	24	
刺網	阿久根	40	4	甌	キビナゴ100	0.1	55	7	47	3	
カツオ釣り・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	1	8		カツオ小79 キハダ8 カツオ中8	8.3	0	—	0	—
	海旋	1	656		カツオ小63 カツオ中33	656.2	2	1,531	0	—	
	山川	中	1	10		カツオ小87 マハチ9	9.8	1	19	0	—
海旋	0	—				—	2	1,667	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月1日付「海況日報」による。  
 黒潮流軸は、海上保安庁8月1日発行「海洋通報平成24年第145号」による。