

鹿児島県漁海況週報

平成27年7月9日発行(7月2日～7月8日)
第2613報【旧暦:5月17日～5月23日/月齢15.5～21.5/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月7日現在、平瀬の北6.4マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月7日現在、76マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬で0.5～0.9℃降温し、与論で変わらず、その他の海域で0.1～1.9℃昇温した。

平年比較では、与路島で“かなり高め”、与論で“やや高め”、黒潮流域、笠利崎で“平年並”、屋久島御崎で“やや低め”、鹿児島、佐多岬で“著しく低め”、その他海域で“かなり低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.3	+0.1	-0.4	平年並
鹿児島	22.4	-0.9	-3.2	著しく低め
佐多岬	23.1	-0.5	-2.2	著しく低め
竹島	24.2	+1.9	-1.8	かなり低め
屋久島御崎	25.9	+1.2	-1.0	やや低め
中之島	27.0	+0.2	-0.9	かなり低め
笠利崎	27.9	+0.4	-0.0	平年並
与路島	28.6	+1.3	+1.4	かなり高め
与論	28.3	+0.0	+0.6	やや高め
甕海峡	23.4	+1.0	-1.8	かなり低め

鹿児島～那覇定期客船観測は7/7-7/8
串木野～甕定期客船観測は7/8

【漁況】

○定置網

甕島海域では、イサキ(500g)が70kg/日、メジナ(500g)が70kg/日の入網。西薩南部海域では、マルアジ(200～300g)が多い日で3.5トン、マダイ(400～600g)が30～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ豆が50kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、サワラ(3kg)が120kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がカマス、ウルメイワシ、マアジ仔主体に29トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、サワラ主体に2.7トンの入網。種子島海域では、ゴマサハ(700～800g)が70kg/日の入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、2～5箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中ヒを15～53箱/統・日、セミヒを24～32箱/統・日、青ヒを11～19箱/統・日の漁。


(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	1.4	縄瀬	ウルメイワシ96	1.4	1	2	2	42
		中	24	229	長島 縄瀬 串木野沖	カタチイワシ53 ウルメイワシ32 マアジ仔6	9.5	10	96	7	82
	枕崎	大	2	14	馬毛島 西新曾根	ゴマサハ中79 ゴマサハ大11 ヒラソウダ6	7.0	1	31	1	12
		中	4	75	屋久島南 馬毛島 黒島 種子島南	ゴマサハ中小56 ゴマサハ中42	18.7	1	4	2	18
	内之浦	中	0	—	—	—	—	1	1	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	3	15	—	—	5.1	2	32	3	54	
	中	28	304	—	—	10.9	12	101	9	100	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	51	37	阿久根沖 長島	ウルメイワシ60 カタチイワシ32	0.7	27	29	11	9	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	43	29	—	カマス30 ウルメイワシ29 マアジ仔10	0.7	48	30	38	66	
刺網	阿久根	57	4	甕 長島	キビナゴ100	0.1	52	6	18	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	1	422	—	カツオ中38 キハダ34 カツオ小25	421.9	2	1,517	2	1,434	
		2	17	—	カツオ大90 カツオ小10	8.4	1	2	2	12	
山川	中	2	17	—	—	8.4	1	2	2	12	
	海旋	3	445	—	カツオ小65 キハダ27 カツオ中7	148.3	1	793	1	690	

○その他

甕島海域では、一本釣りでマダイ(1～5kg)を3～15尾/隻・日、アカハタ(500～700g)を多い日で20尾/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.4～2kg)を20～30kg/隻・日の漁。刺網でサワラ(1kg)を20～30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(500g)を20～30kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1.2～1.3kg)を15～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を10尾/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(2～3kg)を10尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでイサキ(700g)を8～12kg/隻・日、ゴマサハ(800g)を4～5kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.8～1kg)を30～50kg/隻・日、キダイ(400～500g)を15kg/隻・日、イホダイ(400g)を8kg/隻・日の漁。刺網でマダイ(500～600g)を9kg/隻・日、カンパチ(500～600g)を8kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1～1.2kg)を13kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でスマ(2kg)を6～20kg/隻・日の漁。一本釣りでゴマサハ(600～700g)を30～40尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月8日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月8日発行「海洋速報平成27年127号」による。