

# 鹿児島県漁海況週報

平成28年2月25日発行(2月18日～2月24日)  
第2644報【旧暦:1月11日～1月17日/月齢9.5～15.5/潮汐:若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上180番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、2月23日現在、屋久島御崎の南10.5マイル付近にある。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月23日現在、47マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～2.0℃降温した。  
平年比較では、笠利崎、与路島で“やや高め”、黒潮流域、中之島で“平年並”、鹿児島、与論、甌海峡で“やや低め”、佐多岬、竹島、屋久島御崎で“著しく低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.0	-0.2	+0.1	平年並
鹿児島	15.6	-0.2	-0.6	やや低め
佐多岬	15.8	-0.7	-2.0	著しく低め
竹島	16.2	-2.0	-3.0	著しく低め
屋久島御崎	16.9	-1.3	-3.2	著しく低め
中之島	21.7	-0.2	+0.2	平年並
笠利崎	21.3	-0.1	+0.5	やや高め
与路島	21.3	-0.3	+0.5	やや高め
与論	20.8	-0.8	-0.3	やや低め
甌海峡	15.1	-0.9	-1.4	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は2/23～2/24  
串木野一甌定期客船観測は2/24

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、マヅ(500～900g)が50～700kg/日、ゴマサバ(600g)が100～250尾/日、フリ(7～11kg)が30尾/日、メジナ(0.5～1kg)が50～80kg/日の入網。西薩南部海域では、フリ(6～7kg)が40尾/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、メジナ(600～700g)が20～25尾/日、マシ豆が多い日で270kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マヅ(豆～400g)が135kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がフリ、タチウオ、ソウダガツオ主体に22トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、フリ、サワラ主体に8.2トンの入網。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、7～8kgサイズを10～20尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、5～7kgサイズを20～30尾/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域で、1～10箱/隻・日の漁。

## ○トビウオロープ曳網

屋久島海域で、大トビを42～78箱/統・日の漁。


## ○その他

甌島海域では、一本釣りでもたい(6～7kg)を10～60kg/隻・日、メジナ(500～700g)を20～30kg/隻・日の漁。曳縄でフリ(7～16kg)を多い船で56kg/日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.5～1kg)を30～200kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～1.5kg)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでもたい(0.7～1kg)を30～70kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(0.7～3kg)を10～80kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.8～4kg)を100～180尾/隻・日の漁。一本釣りでもたい(0.5～1kg)を多い船で30尾/日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでもたい(1～2kg)を4～10尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみマダイ(1～4kg)を14～15kg/隻、ヒラメ(1kg前後)を14～15kg/隻の漁。熊毛海域では、一本釣りでもたい(4～7kg)を10～60尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでもたい(1kg前後)を3～20kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2595報)					
						1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	9	394	
		中	7	85	縄瀬 甌東	ウルメイワシ75 カクチイワシ21	12.1	6	62	11	63
	枕崎	大	4	121	甌下 臥蛇島 西新曾根 甌西	カクチイワシ44 クサヤモロ小30 マルアジ豆8	30.2	3	153	2	91
		中	7	264	湯瀬 屋久島南東 甌西 島間沖	カクチイワシ30 ゴマサバ中28 オアカムロ豆22	37.7	6	210	11	419
	内之浦	中	0	—	—	—	—	1	2	1	5
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	4	121	—	—	30.2	3	153	11	486	
	中	14	349	—	—	24.9	13	274	23	487	
東海 旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	1	215	
棒受網	阿久根	14	12	阿久根沖 長島	ウルメイワシ69 マイワシ小31	0.8	10	9	39	42	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	22	—	フリ30 タチウオ10 ソウダガツオ10	0.5	46	14	52	23	
刺網	阿久根	大	26	2	阿久根沖 甌長島	キビナゴ100	0.1	20	1	55	3
		中	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カツオ 竿釣・海外 旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	中	0	—	—	—	—	1	94	0	—
		大	1	2	カツオ小63 キハダ17 シイラ10	2.0	0	—	0	—	—
	山川	海旋	0	—	—	—	—	1	758	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月24日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁2月24日発行「海洋通報平成28年36号」による。