

鹿児島県漁海況週報

平成28年9月29日発行(9月22日～9月28日)
第2673報【旧暦：8月22日～8月28日/月齢20.7～26.7/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、9月27日現在、屋久島御崎の南5.8マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月27日現在、32マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、笠利崎で0.2～0.4℃降温し、与論で変わらず、その他の海域で0.1～1.1℃昇温した。平年比較では、佐多岬、竹島、屋久島御崎、甌海峡で“平年並”，その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|------|
| 黒潮流域 | 28.4 | +0.4 | +0.4 | やや高め |
| 鹿児島 | 26.8 | +0.4 | +1.0 | やや高め |
| 佐多岬 | 26.6 | +0.2 | +0.1 | 平年並 |
| 竹島 | 27.2 | +0.1 | +0.3 | 平年並 |
| 屋久島御崎 | 27.4 | -0.4 | +0.1 | 平年並 |
| 中之島 | 28.2 | +0.5 | +0.6 | やや高め |
| 笠利崎 | 28.1 | -0.2 | +0.7 | やや高め |
| 与路島 | 28.4 | +0.4 | +0.7 | やや高め |
| 与論 | 28.4 | +0.0 | +0.6 | やや高め |
| 甌海峡 | 26.5 | +1.1 | +0.5 | 平年並 |

鹿児島一那覇定期客船観測は9/27～9/28
串木野一甌定期客船観測は9/28

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ゴマサバ(300g)が50kg～1.3トン/日、マルアジ(200g)が20～700kg/日、トビウオ(200g)が200～600kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(2.7～3.3kg)が55～60尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ブリ(500g)を250～500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がカマス主体に37トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でヤマトカマス、カンパチ、トビウオ主体に4.1トンの入網。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で13トンの入札があった。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～5箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～6箱/隻・日の漁。種子島海域では、30箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中ヒを40～43箱/統・日、セトヒを1～2箱/統・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgサイズを1～50尾/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2624報) | | | | | |
|------------|------|-----|---------|---------|--------------------------|---------------------------|-------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週 隻数 | 前週 漁獲量 | 前年同期 隻数 | 前年同期 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 1 | 34 | 宇治 | モロ100 | 34.4 | 2 | 11 | 2 | 67 |
| | | 中 | 37 | 416 | 串木野沖 長島 甌西 野間池沖 | カタチイワシ43 サハ類小27 マアジ仔7 | 11.2 | 2 | 25 | 3 | 4 |
| | 枕崎 | 大 | 8 | 291 | 西新管根 湯瀬 屋久島南東 島間沖 | クサヤモロ豆50 ゴマサバ27 オアカムロ中10 | 36.3 | 1 | 41 | 0 | — |
| | | 中 | 19 | 330 | 種子島東 野間池沖 湯瀬 屋久島南東 | ゴマサバ豆35 クサヤモロ豆29 クサヤモロ小12 | 17.3 | 1 | 0.3 | 0 | — |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 中 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 計 | 大 | 9 | 325 | — | — | 36.1 | 7 | 238 | 2 | 67 |
| | | 中 | 56 | 745 | — | — | 13.3 | 44 | 818 | 3 | 4 |
| | 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 枕崎 | 2 | 77 | — | ゴマサバ豆96 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 棒受網 | 阿久根 | 57 | 56 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ41 カタチイワシ37 マイワシ小9 | 1.0 | 0 | 0 | 39 | 90 | |
| | 内之浦 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 35 | 37 | — | カマス71 | 1.0 | 31 | 16 | 40 | 16 | |
| 刺網 | 阿久根 | 33 | 2 | 甌 | キビナゴ100 | 0.1 | 4 | 0.4 | 17 | 1 | |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 大 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海旋 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 中 | 5 | 26 | — | キハダ65 カツオ小30 | 5.1 | 1 | 3 | 0 | — |
| 海旋 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |

○パシウカジキ情報

流し刺網では、甌島海域で20～30kgサイズを20～40尾/隻・日、西薩海域で25～35kgサイズを8尾/隻・日、西薩南部海域で20～30kgサイズを3～5尾/隻・日、鹿児島湾口部大隅半島側で30kgサイズを2～6尾/隻・日の漁。定置網では、西薩南部海域で25～30kgサイズが1～17尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で1日のみ26～39kgサイズが3尾の入網。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を5～30kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.7～1kg)を10～60kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを200～300kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でイセエビ(0.5～1kg)を週計で200kgの漁。熊毛海域では、一本釣りでキダイ(500～600g)を50kg/隻・日、マダイ(4～7kg)を20尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の2日操業でムツ(2kg)を50kg/隻、ナンヨウキンメ(1～2kg)を15kg/隻の漁。一本釣りの2日操業で好ウオ(1～2kg)を50kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月28日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁9月28日発行「海洋速報平成28年180号」による。