

# 鹿児島県漁海況週報

平成30年10月25日発行(10月18日～10月24日)  
第2777報【旧暦:9月10日～9月16日/月齢9.0～15.0/潮汐:長潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月23日現在、竹島の南6.6マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月23日現在、32マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論で1.1℃昇温し、鹿児島、中之島、甌海峡で変わらず、その他の海域で0.2～0.9℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、佐多岬、屋久島御崎、中之島で“かなり低め”、竹島、笠利崎、与路島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.8	-0.2	-0.8	かなり低め
鹿児島	23.7	+0.0	-0.1	平年並
佐多岬	23.7	-0.3	-0.9	かなり低め
竹島	24.9	-0.9	-0.6	やや低め
屋久島御崎	25.1	-0.7	-0.7	かなり低め
中之島	25.5	+0.0	-0.8	かなり低め
笠利崎	25.4	-0.2	-0.5	やや低め
与路島	25.9	-0.2	-0.4	やや低め
与論	26.1	+1.1	-0.4	平年並
甌海峡	24.1	+0.0	+0.3	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は10/23～24  
串木野～甌定期客船観測は10/24

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、サワラ(400～500g)が0.5～1トン/日、コマサハ(200～300g)が500～600kg/日、マルアシ(300g)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、コマサハ(600g)が0.3～6トン/日、カンパチ(0.8～3.7kg)が90～750kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、コマサハ(700～800g)が50～600尾/日、カンパチ(1～3kg)が75～150尾/日、ブリ(1.5～2kg)が40～60尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で33統がサハ類中、チウオ、カマス類主体に14トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、サハ類、ヘタイ主体に20.4トンの入網。

### ○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～6kgを20～150尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、6～13kgを70～190尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～6kgを50～100尾/統・日の漁。

### ○バッチ網

西薩海域では、生で1～1.5トン/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では4～8箱/隻・日の漁。種子島海域では5～10箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ中ヒを60箱/統の漁。屋久島海域では、中ヒを63～132箱/統・日の漁。

### ○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で20～30kgを1～6尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で20～33kgを週計で14尾、鹿児島湾口部大隅半島側で15～30kgを1日のみ2尾の入網。

### ○その他


西薩海域では、底曳網でツキヒカイ(100g)を30kg/隻・日の漁。一本釣でカンパチ(0.8～1.2kg)を7～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを50～100kg/隻・日、ツキヒカイ(80～100g)を40～70kg/隻・日の漁。かかり網でアサヒカニ(400～500g)を30ハイ/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1～2kg)を多い船で20尾/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの5日操業でキハダ(40kg)を10～15尾/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2728報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	20	天草沖	マアジ仔57 サハ類豆20 サハ類小9	19.6	4	114	7	240
		中	12	120	野間池沖 串木野沖 長島	ウルメイワシ61 サハ類小14 ヒラ9	10.0	12	107	14	316
	枕崎	大	7	230	野間池沖 坊津沖 枕崎沖 屋久島南	ウルメイワシ71 ゴマサハ豆17 クサヤモロ中小8	32.8	9	314	3	151
		中	17	418	坊津沖 野間池沖 枕崎沖 内之浦沖	ウルメイワシ45 マアジ豆31 ブリ8	24.6	33	978	6	100
	内之浦	中	0	—			—	2	17	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	8	249			31.2	13	428	10	390	
	中	29	538			18.5	47	1103	20	416	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	118	
棒受網	阿久根	23	43	阿久根沖 長島	ウルメイワシ84 キビナゴ14	1.9	50	146	21	36	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	33	14		サハ類中18 チウオ11 カマス類9	0.4	26	15	33	46	
刺網	阿久根	27	4	甌	キビナゴ100	0.1	30	5	60	13	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	1	269	
		小	0	—			—	0	—	0	—
	山川	海旋	2	1432		キハダ47 カツオ中34 カツオ小12	716.1	0	—	0	—
		中	7	65		キハダ60 カツオ小36	9.2	2	5	1	15
	海旋	2	1469		カツオ小53 キハダ42	734.5	0	—	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月24日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁10月24日発行「海洋速報平成30年200号」による。