

鹿児島県漁海況週報

平成30年11月15日発行(11月8日～11月14日)
第2780報【旧暦:10月1日～10月7日/月齢0.5～6.5/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月14日現在、屋久島御崎の南9.8マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月13日現在、65マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎、甌海峡で0.6～0.8℃昇温し、与論で変わらず、その他の海域で0.2～1.5℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“かなり高め”、笠利崎で“やや高め”、鹿児島で“やや低め”、佐多岬で“かなり低め”、竹島、屋久島御崎で“著しく低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.3	-0.2	-0.1	平年並
鹿児島	21.3	-0.7	-0.6	やや低め
佐多岬	21.4	-0.6	-1.4	かなり低め
竹島	22.6	-1.5	-1.4	著しく低め
屋久島御崎	22.9	-0.9	-1.5	著しく低め
中之島	25.2	-0.2	+0.1	平年並
笠利崎	25.2	+0.6	+0.6	やや高め
与路島	24.7	-0.7	-0.3	平年並
与論	25.0	+0.0	-0.2	平年並
甌海峡	23.5	+0.8	+1.7	かなり高め

鹿児島～那覇定期客船観測は11/14～15
串木野～甌定期客船観測は11/14

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、コマサバ(300g)が0.5～5トン/日、サワラ(0.8～1kg)が100～600kg/日、カンパチ(1～3kg)が20～150kg/日、イサキ(400～500g)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.7～2.5kg)が150～660kg/日、カンパチ(1.3～2.5kg)が100～200尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(1.2～3kg)が20～430尾/日、コマサバ(0.7～0.8kg)が70～700尾/日、ハカツオ(1.5～2kg)が20～140尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がマアジ小、カマス類、キンカガミ主体に17トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、マルアジ、サバ類主体に24.9トンの入網。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgを10～30尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～8kgを80～144尾/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～15箱/隻・日の漁。種子島海域では、5～10箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、生で1トン/統・日の漁があり、製品で15トンの入札があった。志布志湾海域では、製品で14トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを70～150箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを4～77箱/統・日、大ヒを1～10箱/統・日、1日のみ中中ヒを1箱の漁。

○バショウカジキ情報

定置網では、甌島海域で30kgが1日のみ1尾、西薩南部海域で20～30kgが1日のみ3尾、鹿児島湾口部薩摩半島側で19～33kgが週計で5尾の入網。

○その他


西薩海域では、底曳網でツキヒガイ(100g)を100kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(300g)を8～20kg/隻・日の漁。一本釣りカンパチ(1kg)を15尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～200kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、刺網でイセエビ(300～600g)を多い船で20kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でカワリ(100g)を20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りコマサバ(600g)を30～40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの4～5日操業でソテイカ(胴体のみ5～7kg)を多い船で1トンの漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2731報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	7	278	天草沖 縄瀬 枕崎沖	サバ類豆48 サバ類小26 ウルメイワシ13	39.7	7	172	7	423
		中	3	37	野間池沖 串木野沖 長島	マアジ仔38 サバ類小24 マアジ豆16	12.3	17	112	5	90
	枕崎	大	7	288	野間池沖 西新曾根 串木野沖	コマサバ大63 コマサバ豆15 クサヤモロ中小8	41.2	10	687	0	—
		中	22	606	野間池沖 種子島東 種子島南 坊津沖	ウルメイワシ29 オアカムロ中21 クサヤモロ中小14	27.5	44	1328	7	143
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	14	566			40.4	17	859	7	423	
	中	25	643			25.7	61	1439	12	233	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	22	22	阿久根沖 長島	キビナゴ70 カクチイワシ24 マアジ仔6	1.0	59	178	21	15	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	50	17		マアジ小27 カマス類13 キンカガミ10	0.3	45	27	37	17	
刺網	阿久根	40	4	甌 長島	キビナゴ100	0.1	50	5	40	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	中	5	49		カツオ小48 キハダ46	9.8	7	70	1	13
		海旋	0	—			—	0	—	1	811



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月14日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁11月14日発行「海洋速報平成30年215号」による。