

鹿児島県漁海況週報

令和5年6月29日発行(6月22日～6月28日)
第3009報【旧暦:5月5日～5月11日/月齢3.9～9.9/潮汐:中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月27日現在、屋久島御崎の北1.3マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月27日現在、67マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で1.0～3.3℃昇温した。

平年比較では、笠利崎で“やや低め”，黒潮流域、与路島、与論で“平年並”，鹿児島で“やや高め”，中之島、甌海峡で“かなり高め”，その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.2	+1.0	+0.4	平年並
鹿児島	25.7	+2.4	+1.2	やや高め
佐多岬	26.4	+3.0	+2.0	著しく高め
竹島	27.4	+3.3	+2.3	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	28.0	+3.3	+2.2	著しく高め
中之島	28.2	+1.5	+1.1	かなり高め
笠利崎	26.2	+1.5	-0.7	やや低め
与路島	26.3	+2.3	+0.3	平年並
与論	27.2	+1.6	+0.4	平年並
甌海峡	25.8	+1.4	+1.8	かなり高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、6/27～28
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、6/28

【漁況】

○定置網

甌島海域では、幼サコ(200～500g)が100kg/日の入網。週計でハガツオ(600g)が500kg、ゴマサバ(600g)が100kgの入網。西薩南部海域では、シラ(3kg)が100～600kg/日、ハガツオ(500g)が300～500kg/日、カンパチ(1.5kg)が200～500kg/日、トビウオ(100g)が100～150kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(0.6～2kg)が1～1.1t/日、スマ(3.5kg)が150kg/日、シマジ(600～700g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハガツオ(0.8～1.6kg)が400kg、トビウオ(200g)が290kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で32統がサバ類大、ウルメイワシ、ハガツオ主体に19tの入網。志布志湾南部海域では、週計でマジ、ウルメイワシ、サバ類主体に7.8tの入網。

○バッチ網

志布志湾海域では、製品で1.7tの入札があった。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、7～13箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で23箱の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域ではセトビを82～131箱/統・日、中トビを5～18箱/統・日、青トビを6～10箱/統・日、赤トビを3～6箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でヘダイ(1kg)を100kg/隻・日、マダイ(1kg)を13～50kg/隻・日、チダイ(300g)を20～30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～700g)を6～35kg/隻・日の漁。曳網でハガツオ(500g)を10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100kg/隻・日、ツキヒカイ(100g)を50kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを2.3t/日の漁。一本釣りでゴマサバ(400～800g)を12～24kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でハモ(1～1.5kg)を60kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(3～20kg)を50～60kg/隻・日、アカマガシラ(400～500g)を30～40kg/隻・日、ゴマサバ(500～700g)を50～60尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の4日操業でムツ(1～1.5kg)を113kg/隻、キンメダイ(1～2kg)を85kg/隻、3～4日操業でマダイ(1.5～2kg)を22～75kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	2	甌東	マジ小89 マジ中8	2.0	2	13	4	90
		中	18	141	長島 串木野沖 野間池沖	カタチイワシ47 マジ小11 マジ豆9	7.8	10	57	13	83
	枕崎	大	11	123	馬毛島	ゴマサバ小64 マジ中23 ソウダガツオ9	11.2	7	187	6	97
		中	15	201	馬毛島 湯瀬	ゴマサバ小49 ソウダガツオ24 ゴマサバ中13	13.4	14	393	11	117
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	12	125			10.4	9	200	10	188	
	中	33	342			10.4	24	450	24	200	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	53	122	阿久根沖 長島	マイワシ仔35 カタチイワシ34 ウルメイワシ23	2.3	53	104	44	43	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	32	19		サバ類大26 ウルメイワシ14 ハガツオ13	0.6	35	26	34	15	
刺網	阿久根	66	11	甌 阿久根沖 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.2	68	14	113	33	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	
	海旋	2	899		カツオ中49 キハダ33 カツオ大14	449.5	3	2883	1	827	
		10	118		カツオ小92 キハダ7	11.8	12	119	2	11	
海外旋網	山川	中	10	118		カツオ中51 キハダ20 カツオ小17	717.0	2	932	2	1749
		1	717								

※前年同期(第2956報)



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月28日付「海況日報」による。
黒潮流域は、海上保安庁6月28日発行「海洋速報令和119号」による。