


八代海水質調査結果

[調査日：令和3年4月15日]



調査点	水温 (°C)		塩分 (表層)	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 (μg-at/L) <表層>	無機態りん (μg-at/L) <表層>	ケイ酸態ケイ素 (μg-at/L) <表層>	珸矽酸 (μg/L) <表層>
	0m	10m		0m	10m					
①	16.8	16.6	34.1	8.0	8.0	11.0	0.0	0.06	6.9	0.3
②	16.7	16.6	34.0	8.0	8.0	16.0	0.0	0.03	7.2	0.9
③	16.6	16.6	34.1	7.9	7.9	10.5	0.3	0.02	4.3	0.8
④	16.8	16.8	34.1	8.0	7.9	8.0	0.1	0.02	4.2	0.4
⑤	16.6	16.5	34.0	7.9	7.9	16.0	0.1	0.01	4.9	0.4
⑥	16.6	16.6	34.1	7.7	7.8	10.0	0.6	0.02	5.3	0.7
⑦	16.7	16.7	34.1	7.8	7.8	10.0	0.6	0.03	4.6	0.9
⑧	16.6	16.6	34.0	8.0	8.0	17.0	0.0	0.02	3.3	0.3
⑨	16.5	16.5	34.0	7.9	7.8	17.0	0.3	0.01	4.6	0.5
⑩	16.7	16.7	34.1	7.8	7.8	11.0	0.6	0.06	4.0	1.2
⑪	16.5	16.5	33.9	8.1	8.1	12.5	0.0	0.02	2.3	0.5
⑫	16.4	16.4	33.9	7.9	7.9	15.0	0.1	0.01	3.6	0.5
平均	16.6	16.6	34.0	7.9	7.9	12.8	0.2	0.03	4.6	0.6
平年値	15.2	15.1	33.3	8.1	8.0	10.1	1.2	0.16	8.7	1.6

※ 平年値は平成元～令和2年4月上旬の平均値

- 表層水温平均：16.6°C (平年比 +1.4°C) 水温はやや高めとなっています。
- 表層塩分平均：34.0 (平年比 +0.7) 塩分はやや高めとなっています。
- 表層栄養塩類濃度：窒素およびリンは低めとなっています。
  - ・溶存無機窒素 (平均値)：0.2 μg-at/L (平年比 -1.0 μg-at/L )
  - ・溶存無機リン (平均値)：0.03 μg-at/L (平年比 -0.13 μg-at/L )