


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和7年4月8日]



調査点	水温 (°C)		塩分 〈表層〉	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 ($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	無機態りん ($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	ケイ酸態ケイ素 ($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	ケイ酸態シリカ ($\mu\text{g/L}$) 〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	15.9	16.2	33.7	8.6	8.1	5.0	0.8	0.16	12.1	5.5
②	16.4	16.4	34.2	8.5	8.6	8.0	0.4	0.09	5.0	2.3
③	16.8	16.5	34.2	8.5	8.9	5.0	0.0	0.06	5.7	2.9
④	16.2	16.0	33.4	9.0	8.2	4.5	0.0	0.09	10.7	3.5
⑤	16.8	15.6	33.3	9.5	7.1	4.5	0.0	0.11	19.0	2.2
⑥	16.1	15.7	32.7	9.2	8.4	3.5	0.0	0.05	40.7	4.9
⑦	15.9	15.7	33.2	8.2	8.3	3.5	0.0	0.11	22.8	5.4
⑧	16.4	15.8	33.3	9.4	7.6	4.0	0.0	0.10	16.7	2.6
⑨	16.5	15.8	33.3	9.3	7.1	4.0	0.0	0.11	19.7	3.3
⑩	16.7	16.2	33.2	9.0	8.6	4.0	0.0	0.07	17.0	3.6
⑪	16.6	16.2	33.3	9.2	8.9	3.5	0.0	0.07	15.8	2.7
⑫	16.6	16.1	33.4	9.3	8.4	4.0	0.0	0.10	15.1	2.6
平均	16.4	16.0	33.4	9.0	8.2	4.4	0.1	0.09	16.7	3.5
平年値	17.5	17.0	33.2	8.3	8.0	7.7	1.5	0.19	26.5	2.1

※ 平年値は平成元～令和6年の4月上旬の平均値

- 表層水温平均：16.4°C（平年比 -1.1°C） 水温はやや低めとなっています。
- 表層塩分平均：33.4（平年比 +0.2） 塩分は平年並みとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素及びりんは低めとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）： 0.1 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -1.4 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）： 0.09 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.19 $\mu\text{g-at/L}$ ）