


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和7年5月8日]



調査点	水 温 (℃)		塩 分 〈表層〉	溶 存 酸 素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 ($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	無機態りん ($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	ケイ酸態ケイ素 ($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	クロロフィル a ($\mu\text{g/L}$) 〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	18.8	19.0	33.3	8.8	8.2	5.0	0.2	0.03	18.0	2.7
②	19.3	19.2	33.7	8.6	8.5	5.5	1.6	0.05	27.5	1.9
③	19.5	19.4	33.7	8.1	8.3	5.5	0.6	0.02	12.2	1.8
④	18.7	17.7	33.4	8.3	7.5	5.0	0.0	0.05	18.1	1.5
⑤	19.5	17.2	32.2	8.7	7.9	4.0	0.1	0.04	38.2	1.0
⑥	19.9	17.1	32.2	8.9	7.5	4.0	0.1	0.02	46.5	1.0
⑦	21.3	17.6	32.1	9.0	8.0	2.5	0.9	0.07	54.1	3.8
⑧	19.3	18.1	32.5	8.8	8.2	4.5	1.2	0.04	39.9	1.1
⑨	19.2	18.0	32.4	8.9	8.0	5.0	0.2	0.01	41.4	1.2
⑩	19.1	18.0	32.9	8.7	8.0	4.5	0.0	0.02	22.2	0.9
⑪	19.7	17.8	32.9	8.8	8.1	4.0	0.0	0.01	26.2	1.1
⑫	20.1	16.9	32.7	8.9	7.3	4.5	1.1	0.04	41.7	0.8
平 均	19.5	18.0	32.8	8.7	8.0	4.5	0.5	0.03	32.2	1.6
平年値	20.2	18.8	32.5	8.2	8.2	6.5	1.3	0.06	30.5	2.8

※ 平年値は平成元～令和6年の5月上旬の平均値

- 表層水温平均：19.5℃（平年比 -0.7℃） 水温はやや低めとなっています。
- 表層塩分平均：32.8 （平年比 +0.3） 塩分は平年並みとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素及びりんは低めとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）： 0.5 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.8 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）： 0.03 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.03 $\mu\text{g-at/L}$ ）