


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和7年7月8日]



調査点	水温 (°C)		塩分 〈表層〉	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 ($\mu\text{g-at/L}$)	無機態りん ($\mu\text{g-at/L}$)	ケイ酸態ケイ素 ($\mu\text{g-at/L}$)	クロロフィル a ($\mu\text{g/L}$)
	0m	10m		0m	10m		〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉	〈表層〉
①	28.0	26.6	30.5	8.0	7.9	5.5	0.6	0.01	7.1	
②	28.3	26.8	31.0	8.1	7.4	8.5	0.9	0.00	2.1	
③	29.5	26.0	32.0	7.5	7.4	8.0	0.0	0.00	1.3	
④	29.0	25.8	28.8	7.9	7.8	8.0	0.0	0.00	22.2	
⑤	29.5	24.0	28.7	8.2	8.4	10.0	0.0	0.00	28.5	
⑥	29.3	23.6	27.9	8.2	7.8	8.0	0.2	0.00	69.7	
⑦	29.3	22.5	28.3	8.4	5.6	8.0	1.9	0.02	88.5	
⑧	29.5	23.7	27.6	7.8	7.2	8.0	0.0	0.00	56.5	
⑨	29.1	25.0	28.7	8.0	7.6	9.5	0.0	0.00	20.9	
⑩	30.3	23.9	28.7	7.9	8.3	8.0	0.0	0.00	11.6	
⑪	30.4	24.6	28.7	7.7	6.9	8.5	0.0	0.00	15.9	
⑫	30.7	29.8	28.7	7.7	8.9	8.0	0.0	0.00	14.4	
平均	29.4	25.2	29.1	7.9	7.6	8.1	0.3	0.00	28.2	
平年値	26.5	24.0	27.9	8.1	6.7	4.5	1.3	0.05	31.1	

※ 平年値は平成元～令和6年の7月上旬の平均値

- 表層水温平均：29.4°C（平年比 +2.9°C） 水温は高めとなっています。
- 表層塩分平均：29.1 （平年比 +1.2） 塩分はやや高めとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素及びりんは低めとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）： 0.3 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -1.0 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）： 0.00 $\mu\text{g-at/L}$ ※（平年比 -0.05 $\mu\text{g-at/L}$ ） ※：検出限界以下