八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年５月 19 日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	21.3	19.2	31.9	7.4	7.5	4.5	0.1	0.00	26.1	0.0
4	20.8	20.0	32.8	7.7	7.9	11.0	0.0	0.00	13.7	0.0
5	19.9	19.5	33.5	7.7	7.6	9.5	0.0	0.00	10.6	0.0
6	20.7	19.6	33.3	7.7	7.9	14.0	0.3	0.00	11.6	0.0
7	20.2	19.8	33.8	7.6	7.6	11.5	0.2	0.00	9.7	0.0
A	21.1	20.4	32.4	7.6	7.6	10.0	0.0	0.00	20.0	0.0
D	20.3	19.7	33.1	7.7	7.4	9.0	0.1	0.00	14.2	0.0
K	22.6	19.9	33.2	7.9	7.7	4.5	0.0	0.00	15.1	0.0
平　均	20.9	19.8	33.0	7.7	7.7	9.2	0.1	0.00	15.2	#####
過去5年同時期	19.4	18.4	32.0	8.0	7.5	7.8	1.5	0.10	18.0	1.2

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。

※過去５年同時期は調査点２～A のデータで算出

○　表層水温平均：20.9 ℃（過去５年同時期比　+1.5℃）　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：33.0　（過去５年同時期比　+1.0）　塩分はやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素，リンともに低めとなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：0.1μg-at/L　（過去５年同時期比 -1.4μg-at/L　）
　・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L（過去５年同時期比 -0.10μg-at/L）

※：検出限界以下