八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年６月 10 日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	22.6	21.0	29.2	8.8	5.9	2.0	12.1	0.15	141.4	0.0
4	22.0	21.7	30.4	8.6	6.9	4.5	0.0	0.00	29.6	0.0
5	21.8	21.9	31.4	8.1	7.0	7.0	0.3	0.00	22.4	0.0
6	22.2	22.4	31.9	7.9	7.2	8.0	0.0	0.00	14.9	0.0
7	22.5	22.3	33.0	7.5	7.2	11.0	0.1	0.00	13.2	0.0
A	22.5	21.3	29.7	8.8	6.7	3.5	0.2	0.00	31.3	0.0
D	22.7	21.9	30.8	8.6	6.7	4.5	0.3	0.00	22.9	0.0
K	23.3	22.5	29.5	9.4	7.1	4.5	0.2	0.00	18.2	0.0
平　均	22.4	21.9	30.7	8.4	6.8	5.6	1.6	0.02	36.7	#####
過去5年同時期	22.7	21.1	29.7	7.9	6.9	7.9	1.5	0.10	26.3	1.4

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。
※過去５年同時期は調査点２～A のデータで算出

○　表層水温平均：22.4 ℃（過去５年同時期比　-0.3℃）　水温は平年並みとなっています。
○　表層塩分平均：30.7　（過去５年同時期比　+1.0）　塩分はやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素はやや高め，リンは低めとなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：1.6μg-at/L　（過去５年同時期比 +0.1μg-at/L　）
　・溶存無機リン（平均値）：0.02μg-at/L（過去５年同時期比 -0.08μg-at/L）