八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年６月 30 日］



調査点	水温（℃）		塩分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	24.4	23.2	19.2	10.7	5.4	1.8	6.3	0.17	75.4	0.0
4	24.7	23.4	25.6	9.2	6.6	4.5	0.3	0.04	15.9	0.0
5	24.6	23.2	26.1	9.4	6.2	8.7	3.2	0.14	24.1	0.0
6	24.7	23.5	28.5	8.8	7.6	8.5	0.5	0.13	3.9	0.0
7	23.3	23.0	32.2	6.8	6.6	9.5	1.8	0.16	8.2	0.0
A	24.9	22.9	24.7	10.2	5.7	4.3	0.2	0.01	15.5	0.0
D	24.6	23.1	26.4	9.4	7.3	5.5	0.6	0.06	11.7	0.0
K	25.3	23.3	23.4	11.6	5.8	3.0	0.4	0.02	13.4	0.0
平　均	24.6	23.2	25.8	9.5	6.4	5.7	1.6	0.09	21.0	#####
過去5年同時期	22.7	21.1	29.7	7.9	6.9	7.9	1.5	0.10	26.3	1.4

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。
※過去５年同時期は調査点２～Ａのデータで算出

○　表層水温平均：24.6 ℃（過去５年同時期比　+1.9℃）　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：25.8　（過去５年同時期比　-3.9）　　塩分は低めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素はやや高め，リンはやや低めとなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：1.6μg-at/L　（過去５年同時期比 +0.1μg-at/L　）
　・溶存無機リン（平均値）：0.09μg-at/L（過去５年同時期比 -0.01μg-at/L）