八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年７月 22 日］



調査点	水　温（℃）		塩　分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	29.7	24.0	27.0	7.8	3.3	4.0	0.5	0.01	101.3	0.0
4	29.2	25.0	29.4	7.4	5.2	6.0	0.1	0.01	61.2	0.0
5	30.0	25.2	30.4	7.1	6.0	11.0	0.0	0.01	42.6	0.0
6	28.8	25.0	30.8	7.0	5.7	13.0	0.5	0.01	39.1	0.0
7	27.9	25.4	31.3	6.9	6.1	8.5	0.3	0.01	33.9	0.0
A	29.5	24.9	28.2	7.3	4.6	5.0	0.1	0.01	75.0	0.0
D	29.1	25.1	29.6	6.9	5.1	7.0	0.0	0.01	61.9	0.0
K	29.3	25.5	31.1	7.4	5.4	8.0	0.4	0.01	24.3	0.0
平　均	29.2	25.0	29.7	7.2	5.2	7.8	0.2	0.01	54.9	#####
過去5年同時期	26.2	24.2	28.8	7.6	6.3	7.1	2.6	0.13	34.9	3.0

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。
※過去５年同時期は調査点２～Ａのデータで算出

○　表層水温平均：29.2 ℃（過去５年同時期比　+3.0℃）　水温は高めとなっています。
○　表層塩分平均：29.7　（過去５年同時期比　+0.9）　塩分はやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素、リンとも低めとなっています。
- 溶存無機窒素（平均値）：0.2μg-at/L　（過去５年同時期比 -2.4μg-at/L　）
- 溶存無機リン（平均値）：0.01 μg-at/L（過去５年同時期比 -0.12μg-at/L）