八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年９月１日］



調査点	水温（℃）		塩分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	29.7	28.5	31.6	5.9	5.0	4.0	0.1	0.00	8.3	0.0
4	28.9	28.5	32.4	5.9	5.5	10.0	0.2	0.00	12.6	0.0
5	29.0	28.0	32.8	6.2	5.4	18.0	0.2	0.00	12.2	0.0
6	29.5	28.6	32.7	6.4	6.0	20.5	0.1	0.00	10.2	0.0
7	28.1	27.9	33.1	5.7	5.7	10.5	1.9	0.00	13.5	0.0
A	29.5	28.7	32.2	5.9	5.4	6.0	0.1	0.00	12.6	0.0
D	28.6	28.2	32.7	5.5	5.3	7.0	1.8	0.00	16.4	0.0
K	30.6	28.4	32.7	6.6	5.6	4.0	0.0	0.00	16.3	0.0
平　均	29.2	28.4	32.5	6.0	5.5	10.0	0.6	0.00	12.8	#####
過去5年同時期	27.7	26.7	30.6	6.8	5.4	7.6	2.0	0.27	13.5	1.2

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。
※過去５年同時期は調査点２～Ａのデータで算出

○　表層水温平均：29.2 ℃（過去５年同時期比　+1.5℃）　水温はやや高めとなっています。
○　表層塩分平均：32.5　（過去５年同時期比　+1.9）　塩分はやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素、リンとも低めとなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：0.6μg-at/L　（過去５年同時期比 -1.4μg-at/L　）
　・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L※（過去５年同時期比 -0.27μg-at/L）
※：検出限界以下