八代海水質調査結果　　［調査日：令和８年９月 29 日］



調査点	水温（℃）		塩分〈表層〉	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
2	26.5	26.7	32.0	6.2	5.9	3.0	1.7	0.01	16.8	0.0
4	27.0	27.0	32.6	6.1	6.1	7.0	1.7	0.00	10.3	0.0
5	27.0	27.0	32.8	6.3	6.3	7.0	1.3	0.00	8.4	0.0
6	27.0	27.1	32.8	6.3	6.3	8.0	1.1	0.00	10.4	0.0
7	26.5	26.5	33.3	6.2	6.2	10.0	1.2	0.00	7.4	0.0
A	26.9	27.0	32.4	6.0	6.0	6.0	2.0	0.00	11.4	0.0
D	27.0	27.1	32.7	6.1	6.0	5.0	1.8	0.00	10.6	0.0
K	26.3	26.8	32.1	6.6	6.1	3.0	1.0	0.00	13.8	0.0
平　均	26.8	26.9	32.6	6.2	6.1	6.1	1.5	0.00	11.1	#####
過去5年同時期	27.7	26.7	30.6	6.8	5.4	7.6	2.0	0.27	13.5	1.2

※調査点Ｋは令和２年度，調査点Ｄは令和５年度からの新規調査地点。
※過去５年同時期は調査点２～Ａのデータで算出

○　表層水温平均：26.8 ℃（過去５年同時期比　-0.9℃）　水温はやや低めとなっています。
○　表層塩分平均：32.6　（過去５年同時期比　+2.0）　　塩分はやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素、リンとも低めとなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：1.5μg-at/L　（過去５年同時期比 -0.5μg-at/L　）
　・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L※（過去５年同時期比 -0.27μg-at/L）
※：検出限界以下