八代海水質調査結果　　[調査日：令和８年５月 12 日]



調査点	水　温（℃）		塩　分（表層）	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ケイ酸態ケイ素（μg-at/L）〈表層〉	クロロフィルa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	20.5	18.7	33.2	7.7	7.7	15.0	0.7	0.00	5.8	0.4
②	20.0	18.6	33.3	7.7	7.9	20.0	1.1	0.06	6.2	0.3
③	19.3	18.8	32.9	7.7	7.3	19.0	1.0	0.02	6.4	0.2
④	20.2	18.5	32.9	7.8	7.8	15.0	0.3	0.00	12.0	0.7
⑤	19.9	18.6	32.8	7.8	7.8	20.0	0.2	0.00	10.9	0.3
⑥	19.1	18.7	33.2	7.2	7.0	15.0	0.9	0.05	6.4	0.4
⑦	19.5	19.0	32.7	7.7	7.6	15.0	0.8	0.00	7.3	0.2
⑧	20.1	18.5	32.6	7.6	7.9	18.0	0.8	0.00	8.2	0.1
⑨	20.1	18.6	32.6	7.8	7.9	22.0	0.4	0.00	13.1	0.1
⑩	19.8	19.0	32.1	7.8	7.8	12.0	0.0	0.00	10.3	0.6
⑪	19.9	18.3	32.3	7.7	7.9	19.0	0.2	0.00	8.7	0.3
⑫	20.3	18.5	32.7	7.8	7.9	19.0	0.4	0.00	12.7	0.2
平　均	19.9	18.7	33.1	6.3	7.7	12.0	0.6	0.01	9.0	0.3
平年値	19.6	18.8	33.0	7.6	7.5	11.8	1.1	0.10	10.9	1.1

※　平年値は平成元～令和７年５月の平均値

- ○　表層水温平均：19.9℃（平年比　+0.3℃）　　水温は平年並みとなっています。
- ○　表層塩分平均：33.1　（平年比　+0.1）　　塩分は平年並みとなっています。
- ○　表層栄養塩類濃度：窒素及びリンは平年より低くなっています。
  - ・溶存無機窒素（平均値）：0.6μg-at/L　（平年比　-0.5μg-at/L）
  - ・溶存無機リン（平均値）：0.01μg-at/L（平年比　-0.09μg-at/L）