八代海水質調査結果　　[調査日：令和８年７月７日]



調査点	水　温（℃）		塩　分（表層）	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	24.3	23.6	32.2	7.3	6.5	9.0	0.0	0.00	17.5	3.5
②	24.7	23.9	31.8	7.9	6.8	6.0	0.0	0.00	23.9	4.6
③	25.0	23.9	31.1	8.2	7.1	9.0	0.0	0.00	25.2	1.5
④	25.0	23.7	31.8	8.2	6.5	9.0	0.0	0.00	22.4	2.9
⑤	25.5	23.7	31.3	9.4	6.4	7.5	0.0	0.00	28.1	4.8
⑥	25.3	24.2	31.0	8.0	7.5	11.0	0.0	0.00	27.7	1.4
⑦	25.7	24.3	29.9	9.5	7.5	9.0	0.7	0.00	20.6	1.3
⑧	25.7	23.6	30.8	9.0	6.2	8.5	0.0	0.00	19.3	1.3
⑨	27.0	23.7	29.1	8.9	6.0	8.5	9.8	0.38	67.3	6.6
⑩	25.9	23.6	29.2	9.5	5.9	9.0	6.7	0.29	36.2	1.6
⑪	26.6	23.9	29.7	9.8	6.5	9.0	12.1	0.75	36.0	1.4
⑫	25.7	23.5	30.5	9.0	6.3	8.5	0.3	0.00	20.2	4.5
平　均	25.5	23.8	33.1	6.3	6.6	12.0	2.5	0.12	28.7	2.9
平年値	25.8	23.6	30.2	7.4	6.7	8.0	1.7	0.06	12.6	2.4

※　平年値は平成元～令和７年７月の平均値

○　表層水温平均：25.5℃（平年比　-0.3℃）　　水温は平年並みとなっています。
○　表層塩分平均：33.1　（平年比　+2.9）　　塩分は平年より高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素及びリンは平年より高くなっています。
- 溶存無機窒素（平均値）：2.5μg-at/L　（平年比　+0.8μg-at/L）
- 溶存無機リン（平均値）：0.12μg-at/L（平年比　+0.06μg-at/L）