八代海水質調査結果　　[調査日：令和８年８月４日]



調査点	水　温（℃）		塩　分（表層）	溶存酸素（mg/L）		透明度（m）	無機態窒素（μg-at/L）〈表層〉	無機態りん（μg-at/L）〈表層〉	ｹｲ酸態ｹｲ素（μg-at/L）〈表層〉	ｸﾛﾛﾌｨﾙa（μg/L）〈表層〉
	0m	10m		0m	10m					
①	29.1	26.3	31.9	6.7	6.3	9.0	0.0	0.00	13.1	
②	29.3	26.1	31.9	6.8	6.3	8.5	0.0	0.00	11.3	
③	31.0	26.4	31.3	6.6	6.1	10.0	0.0	0.00	20.6	
④	30.3	25.8	31.8	6.7	6.2	9.0	0.0	0.00	9.8	
⑤	30.7	26.0	31.3	7.1	6.3	7.0	0.0	0.00	10.2	
⑥	29.8	26.3	31.5	6.4	5.9	10.0	0.0	0.00	14.1	
⑦	30.6	25.9	31.0	6.5	5.7	9.5	0.0	0.00	26.0	
⑧	30.2	25.8	31.6	6.6	5.8	9.5	0.0	0.00	13.9	
⑨	31.0	26.3	31.4	6.8	6.0	8.5	0.0	0.00	9.1	
⑩	29.3	26.8	30.9	6.5	5.9	8.0	0.0	0.00	26.4	
⑪	30.4	26.0	31.0	6.5	5.7	9.5	0.0	0.00	17.4	
⑫	30.4	25.8	31.6	6.8	5.7	10.0	0.0	0.00	14.0	
平　均	30.2	26.1	33.1	6.3	6.0	12.0	0.0	0.00	15.5	
平年値	27.5	25.8	31.0	7.0	6.3	8.3	1.3	0.07	10.0	2.0

※　平年値は平成元～令和７年８月の平均値

○　表層水温平均：30.2℃（平年比　+2.7℃）　　水温は平年より高めとなっています。
○　表層塩分平均：33.1　（平年比　+2.1）　　塩分は平年よりやや高めとなっています。
○　表層栄養塩類濃度：窒素及びリンは平年より高くなっています。
　・溶存無機窒素（平均値）：0.0μg-at/L　（平年比　-1.3μg-at/L）　※：検出限界以下
　・溶存無機リン（平均値）：0.00μg-at/L（平年比　-0.07μg-at/L）※：検出限界以下