

# 鹿児島県漁海況週報

令和6年5月23日発行(5月16日～5月22日)  
第3054報【旧暦：4月9日～4月15日/月齢8.0～14.0/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月21日現在、屋久島御崎の南6.3マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月21日現在、23マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎で0.1℃降温し、与路島で変わらず、その他の海域で0.2～1.6℃昇温した。

平年比較では、佐多岬で“やや低め”、黒潮流域、屋久島御崎、与論で“かなり高め”、中之島で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.8	+0.2	+1.0	かなり高め
鹿児島	20.3	+0.3	-0.6	平年並
佐多岬	20.6	+0.5	-1.0	やや低め
竹島	22.7	+1.2	-0.1	平年並
屋久島御崎(永田岬)	25.2	+1.6	+1.5	かなり高め
中之島	26.6	+0.8	+1.3	著しく高め
笠利崎	24.4	-0.1	+0.4	平年並
与路島	23.7	+0.0	-0.0	平年並
与論	24.9	+0.4	+0.8	かなり高め
甌海峡	20.8	+1.3	+0.0	平年並

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、5/21～22  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、5/22

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、イサキ(300g)が70～280kg/日、メジナ(0.6～1kg)が100～200kg/日、イシダイ(1.5～2kg)が20～60kg/日の入網。週計でマシ(50～200g)が3t、マダイ(2kg)が550kg、ゴマサバ(0.6～1kg)が220kgの入網。西薩南部海域では、コショウダイ(2kg)が250～500kg/日、フリ(5～6kg)が300～400kg/日、トビウオ(100～200g)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、コンナガ(2.5kg)が130～470kg/日、チウオ(1.5～3kg)が20～70kg/日の入網。1日のみフリ(6kg)が330kg、ゴマサバ(500～600g)が330kg、カンパチ(4～5kg)が230kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサバ(400～800g)が3.8t、カンパチ(0.6～5kg)が2.8t、スマ(1～1.2kg)が250kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がソウダガツオ、フリ、カクチイワシ主体に28tの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、カクチイワシ、サハフグ類主体に8tの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～21箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で35箱の漁。

### ○パッチ網

西薩海域では、1日のみ生で230～320kg/統の漁。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中トビを8～54箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.4～2kg)を20～100kg/隻・日の漁。一本釣りでマシ(50～200g)を5～20kg/隻・日、イサキ(300～500g)を14～16kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100～150kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサバ(500～600g)を20～24kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2～4日操業でキハダ(11～41kg)を128～478kg/隻の漁。旗流しの3～4日操業でソレイカ(胴体のみ10～12kg)を278kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第3005)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	81	天草沖 五島沖 牛深沖	マイワシ中50 マシ大28 サハ類小11	20.3	7	258	8	264
		中	2	3	長島	カクチイワシ82 アカマス5	1.5	5	42	10	95
	枕崎	大	2	16	野間池沖 馬毛島	ウルメイワシ57 マシ中小23 ゴマサバ豆10	8.0	9	313	5	150
		中	9	166	湯瀬 屋久島南 串木野沖 硫黄島沖	ゴマサバ中67 ウルメイワシ フリ7	18.4	19	486	14	268
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	6	97	—	—	16.2	16	571	13	414	
中	11	169	—	—	—	15.4	24	528	24	363	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
枕崎	1	234	東シ海	ゴマサバ中39 マシ小38 マシ中小13	234.0	1	25	0	—	—	
棒受網	阿久根	25	17	阿久根沖 長島	カクチイワシ87 ウルメイワシ9	0.7	25	25	47	44	
内之浦	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	28	—	ソウダガツオ56 フリ8 カクチイワシ7	0.8	33	22	39	67	
刺網	阿久根	69	11	甌 川内沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	71	10	84	23	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	0	—	—	—	—	—	1	894	0	—
	山川	中	3	26	—	カツオ小75 キハダ21	8.7	7	58	10	76
		海旋	2	1022	—	カツオ小88 キハダ6 カツオ中5	511.0	4	1394	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月22日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁5月22日発行「海洋速報令和6年93号」による。