

# 鹿児島県漁海況週報

令和6年7月4日発行(6月27日～7月3日)  
第3060報(旧暦:5月22日～5月28日/月齢20.6～26.6/潮汐:小潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)


黒潮北縁域は、7月2日現在、平瀬の南6.8マイル付近にあり、離岸している。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月2日現在、27マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.3～2.3℃昇温した。  
 平年比較では、鹿児島、笠利崎、甌海峡で“やや高め”、中之島、与路島で“著しく高め”、その他の海域で“かなり高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.4	+0.9	+1.1	かなり高め
鹿児島	26.2	+2.3	+1.1	やや高め
佐多岬	26.6	+2.2	+1.7	かなり高め
竹島	27.4	+1.8	+1.9	かなり高め
屋久島御崎(永田岬)	27.7	+1.1	+1.3	かなり高め
中之島	29.2	+0.3	+1.7	著しく高め
笠利崎	28.0	+0.8	+0.6	やや高め
与路島	28.4	+1.9	+1.8	著しく高め
与論	28.9	+2.1	+1.5	かなり高め
甌海峡	25.5	+1.1	+1.0	やや高め

鹿児島～那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、7/2～3(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
 串木野～甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、7/3

## 【漁況】主要な魚種のみ記載しています。

### ○定置網

甌島海域では、週計でメジナ(1～1.2kg)が150kg、ハマエフキ(1～3kg)が70kg、ヒラサガ(1.2kg)が35kg、シマシ(1.5kg)が15kgの入網。1日のみイサキ(0.1～1kg)が770kg、ツバメウオ(2.5kg)が20kgの入網。西薩南部海域では、スマ(1.5kg)が0.2～1t/日、イサキ(300～400g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒラソウダ(1.5kg)が1t/日、マダイ(150～200g)が300kg/日、カンパチ(1.5kg)が90kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でイサキ(400～600g)が680kg、ハマエフキ(1.7kg)が480kg、カンパチ(0.9～5kg)が250kgの入網。1日のみスマ(1～1.2kg)が300kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がウルメイワシ、ソウダガツオ類、カマス類主体に19tの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マサシ、マルソウダ主体に4.1tの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1日のみ7箱/隻の漁。西薩南部海域では、1～35箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトヒを32～76箱/統・日、中トビを6～9箱/統・日の漁。

### ○パッチ網

西薩海域では、製品で1tの入札があった。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(400～700g)を100kg/隻・日、チダイ(300g)を40～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(100～500g)を8～33kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、1日のみ一本釣りでハグツオ(2～5kg)を100kg/隻、ゴマサハ(800～900g)を50kg/隻の漁。志布志湾海域では、かご網でパイを週計で34kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～8kg)を100kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの1～2日操業でナヨウキン(1～2kg)を19kg/隻、アオダイ(1～2kg)を12kg/隻、キンダイ(1～1.5kg)を9kg/隻、ハマダイ(1.5～7kg)を7kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第3010)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	125	甌東	マイワシ仔63 カクチイワシ24 ウルメイワシ10	25.0	2	31	0	0
		中	5	65	甌東 長島	マイワシ仔69 カクチイワシ16 ウルメイワシ11	13.0	3	18	0	0
	枕崎	大	0	—			—	0	—	1	2
		中	8	196	津倉 枕崎沖 馬毛島	ゴマサハ中62 ゴマサハ中小21 ウルメイワシ5	24.5	3	51	2	70
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	5	125			25.0	2	31	1	2
中	13	261				20.1	6	69	2	70	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	1	62		ゴマサハ中小96	62.0	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	1	0.2	長島	マイワシ小87 カクチイワシ8 ウルメイワシ5	0.2	7	4	2	2	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	34	19		ウルメイワシ37 ソウダガツオ類13 カマス類11	0.6	30	22	35	27	
刺網	阿久根	大	0	—	甌 川内沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	32	5	16	2
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	海旋	0	—			—	2	217	0	0
		中	4	28		カツオ小91 キハダ6	7.0	4	28	7	57
	山川	海旋	2	910		カツオ小86 キハダ7 カツオ中6	455.0	3	1290	1	956
		中	0	—			—	0	—	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月3日付「海況日報」による。  
 黒潮流軸は、海上保安庁7月3日発行「海洋速報令和6年123号」による。  
 図中の魚種名は漁場毎の上位3種を記載しているため、左の表の魚種表示とは異なります。