

# 鹿児島県漁海況週報

令和6年7月18日発行(7月11日～7月17日)  
第3062報【旧暦:6月6日～6月12日/月齢5.2～11.2/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月16日現在、平瀬の北9.4マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月16日現在、201マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬で0.9～1.2℃降温し、竹島で変わらず、その他の海域で0.1～0.9℃昇温した。

平年比較では、鹿児島で“かなり低め”、佐多岬で“平年並”、竹島、甌海峡で“やや高め”、屋久島御崎で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	31.0	+0.3	+1.8	著しく高め
鹿児島	25.8	-0.9	-1.2	かなり低め
佐多岬	26.8	-1.2	+0.2	平年並
竹島	27.9	+0.0	+0.8	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	29.1	+0.8	+1.3	かなり高め
中之島	30.1	+0.1	+1.6	著しく高め
笠利崎	31.0	+0.9	+2.6	著しく高め
与路島	29.8	+0.7	+1.9	著しく高め
与論	30.6	+0.6	+2.1	著しく高め
甌海峡	27.7	+0.9	+1.1	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、7/16～17  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、7/17

## 【漁況】 主要な魚種のみ記載しています。

### ○定置網

甌島海域では、シマジ(2～3kg)が50kg/日、イサキ(300～500g)が50kg/日、アオリイカ(1～1.5kg)が20kg/日、メジナ(700～800g)が10kg/日の入網。西薩南部海域では、ムロアジ(150～200g)が100～150kg/日、コンナガ(1.5kg)が50～100kg/日、イサキ(200～300g)が50～100kg/日の入網。週計でスマ(1.5～2kg)が1t、マルソウダ(1kg)が400kg、シイラ(3～4kg)が300kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(0.8～1.1kg)が460kgの入網。1日のみゴマサバ(600～800g)が190kg、スマ(1～1.2kg)が160kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で29統がウルメイワシ、マアジ仔、サバ類中主体に38tの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マアジ、ヤマトカマス主体に6.7tの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～9箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～10箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを80箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを17～54箱/統・日、中トビを3～7箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.4～1kg)を12～90kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、かご網でマダコ(1～2kg)を週計で28kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～6kg)を150kg/隻・日、アオダイ(1kg)を150kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2～5日操業でキハダ(35～50kg)を700kg/隻、ハマダイ(1.5～3kg)を31kg/隻、ナンヨウキンメ(1～1.5kg)を27kg/隻の漁。延縄の4日操業でキンメダイ(1～1.5kg)を400kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第3012報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	4	64	0	—	
		中	5	40	串木野沖	マアジ豆63 マアジ仔17 マイワシ中5	8.0	6	94	7	48
	枕崎	大	2	65	屋久島南 枕崎沖	ウルメイワシ23 オアカムロ中小12 マサバ豆11	32.5	5	67	2	29
		中	4	154	枕崎沖 津倉坊津沖	マイワシ43 ウルメイワシ22 ゴマサバ中15	38.5	9	208	6	71
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	65	—	—	32.5	9	131	2	29	
	中	9	194	—	—	21.6	15	302	13	119	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	1	11	東シ海	ゴマサバ大68 マサバ大17 マアジ豆6	11.0	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	26	26	阿久根沖 長島	マイワシ小51 ウルメイワシ32 カクチイワシ16	1.0	44	57	16	12	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	4	23	
定置網	内之浦	29	38	—	ウルメイワシ62 マアジ仔11 サバ類中8	1.3	32	29	28	32	
刺網	阿久根	20	2	甌 川内沖 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	58	9	24	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	3	12	—	カツオ小100	4.0	9	34	6	51
		海旋	0	—	—	—	—	0	—	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月17日付「海況日報」による。  
黒潮流域は、海上保安庁7月17日発行「海洋速報令和6年132号」による。