

鹿児島県漁海況週報

令和3年6月17日発行(6月10日～6月16日)
第2907報【旧暦:5月1日～5月7日/月齢:29.3～5.7/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月16日現在、屋久島御崎の北8マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月15日現在、23マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して竹島、与路島で0.1～1.0℃降温し、その他の海域で0.1～2.3℃昇温した。

平年比較では、竹島で“著しく低め”、佐多岬で“やや低め”、黒潮流域、与路島、甑海峡で“やや高め”、屋久島御崎、与論で“かなり高め”、中之島で“著しく高め”、鹿児島、笠利崎で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.5	+0.6	+0.5	やや高め
鹿児島	23.5	+1.3	+0.2	平年並
佐多岬	22.9	+0.9	-0.7	やや低め
竹島	23.1	-1.0	-1.4	著しく低め
屋久島御崎(永田岬)	26.5	+2.3	+1.3	かなり高め
中之島	27.5	+1.0	+1.1	著しく高め
笠利崎	25.7	+0.5	+0.3	平年並
与路島	25.8	-0.1	+0.8	やや高め
与論	26.6	+0.7	+1.0	かなり高め
甑海峡	24.1	+0.1	+0.9	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は6/16～17
串木野～甑定期客船観測は6/17

【漁況】

○定置網

甑島海域では、フリ(1～2kg)が95kg/日、ニサダイ(1kg)が50～60kg/日、週計でヒラソウダ(1kg)が382kg、メジナ(700～900g)が330kg、スマ(1kg)が254kgの入網。西薩南部海域では、マルソウダ(400g)が100kg/日、シイラ(2kg)が50kg/日、カンパチ(1.5kg)が50kg/日、イサキ(300g)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハツオ(1.5～1.6kg)が137～620kg/日、イサキ(300～800g)が151～668kg/日、1日のみチウオ(0.6～1kg)が250kg、スマ(1.2kg)が104kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハツオ(1.5kg)が3.2トン、カンパチ(1.3～5kg)が1.3トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で27統がウルメイワシ、マアジ、フリ主体に23トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、マアジ、チウオ主体に45トンの入網。

○キビナゴ刺網

甑島海域では、1～6箱/隻・日の漁。西薩南部海域では5～30箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを40箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを57～117箱/統・日、中トビを13～20箱/統・日、青トビを10～17箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を20～50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を13～50kg/隻・日の漁。延縄でアカアマダイ(300g)を25kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～700g)を10～30kg/隻・日、メジナ(0.5～1kg)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを50～200kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(400～500g)を5～20kg/隻・日、アカハタ(0.5～1kg)を5～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、1日のみ底曳網でオオコハ(2～4kg)を30kg/隻、キダイ(300～600g)を30kg/隻、ハモ(0.8～1.2kg)を20kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(3～10kg)を50kg/隻・日、ゴマサハ(500～700g)を24～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～7日操業でソテツイカ(胴体のみ10kg)を6～19ハイ/隻の漁。一本釣りで1日のみキンメダイ(800g)を222kg/隻、ムツ(1kg)を35kg/隻、ナンヨウキンメ(1kg)を35kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2858報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	2	28	5	83	
		中	14	120	長島 甑西 串木野沖 野間池沖	カタチイワシ42 ウルメイワシ15 サハ類豆15	8.6	14	47	21	189
	枕崎	大	8	172	屋久島南	ゴマサハ豆44 ゴマサハ中小36 ゴマサハ中11	21.5	8	199	3	86
		中	10	136	湯瀬 硫黄島沖 竹島 屋久島南	ゴマサハ中小66 ゴマサハ中30	13.6	21	508	5	78
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	8	172	—	—	21.5	10	227	8	169	
	中	24	256	—	—	10.7	35	555	26	267	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	22	48	阿久根沖 長島	ウルメイワシ46 カタチイワシ26 マイワシ小24	2.2	17	27	70	85	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	1	3	
定置網	内之浦	27	23	—	ウルメイワシ34 マアジ豆28 フリ16	0.9	34	20	39	28	
刺網	阿久根	111	17	甑 阿久根沖 牛深沖 川内沖	キビナゴ100	0.2	101	17	87	19	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	1	11	—	カツオ小97	—	0	—	0	—
	海旋	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
海外旋網	山川	中	4	42	—	カツオ小74 カツオ中14 キハダ12	10.5	3	22	0	—
		海旋	1	722	—	カツオ小53 マハチ24 キハダ22	722.0	1	766	1	782



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月16日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月16日発行「海洋通報令和3年111号」による。