

鹿児島県漁海況週報

令和3年7月21日発行(7月15日～7月20日)
第2912報【旧暦:6月6日～6月11日/月齢:5.1～10.1/潮汐:中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月18日現在、屋久島御崎の南6.2マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月19日現在、24マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して与路島で0.1℃昇温し、鹿児島、佐多岬、竹島、与論で変わらず、その他の海域で0.2～0.8℃降温した。

平年比較では鹿児島で“やや低め”、中之島、与路島、甕海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.4	-0.3	+0.2	平年並
鹿児島	26.2	+0.0	-1.1	やや低め
佐多岬	27.1	+0.0	+0.3	平年並
竹島	27.8	+0.0	+0.4	平年並
屋久島御崎(永田岬)	28.3	-0.3	+0.3	平年並
中之島	29.0	-0.2	+0.5	やや高め
笠利崎	28.6	-0.4	+0.2	平年並
与路島	28.8	+0.1	+0.8	やや高め
与論	28.6	+0.0	+0.1	平年並
甕海峡	27.8	-0.8	+0.9	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は7/15～7/19
串木野～甕定期客船観測は7/20

【漁況】

○定置網

甕島海域では、タサコ(300～500g)が20～40kg/日、メジナ(0.6～1kg)が30kg/日、1日のみイサキ(400g)が600kgの入網。西薩南部海域では、ウルメイワシ(20～30g)が200～300kg/日、マルソウダ(1kg)が100～200kg/日、マルアジ(200g)が100kg/日、1日のみハガツオ(1kg)が200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(2～2.3kg)が0.5～1.8トン/日、ハガツオ(800～900g)が221～455kg/日、スマ(1.5～1.8kg)が100～229kg/日、キハダ(45～65kg)が1～9尾/日、1日のみカンパチ(3kg)が165kg、ハシロウカンギ(19～20kg)が2尾、タマカイ(117kg)が1尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でスマ(1.7kg)が375kg、カンパチ(1.4kg)が260kg、ヒラソウダ(600～700g)が150kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で26統がチウオ、ウルメイワシ、サハ類中主体に19トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、チウオ、ウルメイワシ主体に23.1トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、1～3箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、7～8箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小ヒを1日のみ6000尾/統の漁。

○その他


甕島海域では、一本釣りで1日のみカンパチ(5～20kg)を70kg/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を5～50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を4～45kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(500g)を10～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～300kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1～1.5kg)を30～40kg/隻・日、イサキ(300～400g)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを週計で6トンの漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみハモ(700～800g)を50kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りの3日操業でハマダイ(1～5kg)を100kg/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りの4～6日操業でキハダ(30～60kg)を1.3トン/隻の漁。一本釣りの1～4日操業でマダイ(5～6kg)を120kg/隻、マハタ(30kg)を120kg/隻、ハマダイ(2～10kg)を30～60kg/隻、ナンヨウキンメ(1.5kg)を20kg/隻の漁。延縄の3～4日操業でムツ(1.5～2kg)を150～230kg/隻、マダイ(2～3kg)を150kg/隻、キンマダイ(1.5kg)を50kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2863報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	2	牛深沖	ウルメイワシ76 マアジ仔11	2.1	0	—	0	—
		中	8	60	串木野沖 長島	カクチイワシ27 サハ類豆20 マアジ小20	7.5	11	88	5	15
	枕崎	大	3	34	馬毛島 屋久島南	ゴマサハ中小56 オアカムロ中40	11.2	2	14	4	100
		中	7	93	竹島 湯瀬 馬毛島	ゴマサハ小44 ゴマサハ中小29 クサヤモロ小8	13.3	11	163	9	90
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	4	36			8.9	2	14	4	100	
	中	15	153			10.2	22	251	14	105	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎		0	—		—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根		82	164	阿久根沖 長島	ウルメイワシ87	2.0	36	37	24	45
	内之浦		0	—		—	0	—	0	—	
定置網	内之浦		26	19		チウオ30 ウルメイワシ26 サハ類中12	0.7	35	26	36	58
刺網	阿久根		30	2	甕 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	44	5	34	5
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋		0	—			—	0	—	0	—
海外旋網	山川	中	5	66		カツオ小70 カツオ中28	13.3	8	89	0	—
		海旋	1	716		カツオ小83 キハダ8 カツオ中6	715.6	0	—	2	888



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月20日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月20日発行「海洋通報令和3年135号」による。